

## TEMA 10 – APLICACIONES DE LA DERIVADA

### RECTA TANGENTE

**EJERCICIO 1 :** Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{e^x}$  en  $x_0 = 0$ .

Solución:

- Ordenada del punto:  $f(0) = 1$
- Pendiente de la recta:  $f'(x) = \frac{2xe^x - (x^2 + 1) \cdot e^x}{(e^x)^2} = \frac{e^x (2x - x^2 - 1)}{(e^x)^2} = \frac{2x - x^2 - 1}{e^x} \Rightarrow f'(0) = -1$
- Ecuación de la recta tangente:  $y - 1 = -1(x - 0) \rightarrow y = -x + 1$

**EJERCICIO 2 :** Escribe las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva  $x^2 - 3y^2 + 2x + 9 = 0$  en  $x_0 = 1$ .

Solución:

- Ordenadas de los puntos:  $1 - 3y^2 + 2 + 9 = 0 \rightarrow 12 = 3y^2 \rightarrow 4 = y^2 \rightarrow \begin{cases} y = -2 \\ y = 2 \end{cases}$

Hay dos puntos:  $(1, -2)$  y  $(1, 2)$

- Pendientes de las rectas:  $2x - 6y \cdot y' + 2 = 0 \Rightarrow y' = \frac{-2 - 2x}{-6y} \rightarrow y' = \frac{1 + x}{3y}$

$$y'(1, -2) = \frac{1+1}{-6} = \frac{2}{-6} = -\frac{1}{3}$$

$$y'(1, 2) = \frac{1+1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

- Ecuaciones de las rectas tangentes:

- En  $(1, -2) \rightarrow y = -2 - \frac{1}{3}(x - 1) \rightarrow y = -\frac{1}{3}x - \frac{5}{3}$

- En  $(1, 2) \rightarrow y = 2 + \frac{1}{3}(x - 1) \rightarrow y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$

**EJERCICIO 3 :** Halla la ecuación de la recta tangente a la curva  $y = \frac{x^2(x-1)}{\sqrt{x+1}}$  en  $x_0 = 3$ .

Solución:

- Ordenada en el punto:  $y(3) = 9$

- Pendiente de la recta:  $y = \frac{x^2(x-1)}{\sqrt{x+1}} = \frac{x^3 - x^2}{\sqrt{x+1}} \Rightarrow$

$$y' = \frac{(3x^2 - 2x)\sqrt{x+1} - (x^3 - x^2) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{(x+1)} = \frac{2(3x^2 - 2x)(x+1) - (x^3 - x^2)}{2\sqrt{(x+1)^3}} = \frac{5x^3 + 3x^2 - 4x}{2\sqrt{(x+1)^3}} \Rightarrow y'(3) = \frac{75}{8}$$

- Ecuación de la recta tangente:  $y = 9 + \frac{75}{8}(x - 3) \rightarrow y = \frac{75}{8}x - \frac{153}{8}$

### ESTUDIO DE FUNCIONES

**EJERCICIO 4 :** Halla los intervalos de crecimiento y los máximos y mínimos de la función:  $f(x) = \frac{3x^2 - 9x + 3}{3x - 1}$

Solución:

$$f'(x) = \frac{(6x - 9)(3x - 1) - (3x^2 - 9x + 3) \cdot 3}{(3x - 1)^2} = \frac{18x^2 - 6x - 27x + 9 - 9x^2 + 27x - 9}{(3x - 1)^2} = \frac{9x^2 - 6x}{(3x - 1)^2}$$

$$f'(x)=0 \rightarrow 9x^2 - 6x = 0 \rightarrow 3x(3x-2)=0 \rightarrow \begin{cases} 3x=0 \rightarrow x=0 \\ 3x-2=0 \rightarrow x=\frac{2}{3} \end{cases}$$

Signo de  $f'(x)$ :

$$\begin{array}{ccccccc} & f' > 0 & & f' < 0 & & f' > 0 & \\ & \nearrow & 0 & \searrow & \frac{2}{3} & \nearrow & \\ & & & & & & \end{array}$$

$f(x)$  es creciente en  $(-\infty, 0) \cup \left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ ; es decreciente en  $\left(0, \frac{2}{3}\right)$ . Tiene un máximo en  $(0, -3)$  y un mínimo en  $\left(\frac{2}{3}, -\frac{5}{3}\right)$ .

**EJERCICIO 5 : Halla los máximos, mínimos y puntos de inflexión de la curva:  $f(x) = 5x^2(x-1)^2$  Di dónde es creciente, decreciente, cóncava y convexa.**

Solución:

• Primera derivada:  $f'(x) = 10x(x-1)^2 + 5x^2 \cdot 2(x-1) = 10x(x-1)^2 + 10x^2(x-1) =$

$$= 10x(x-1)(x-1+x) = 10x(x-1)(2x-1) \Rightarrow f'(x) = 0 \begin{cases} x=0 \\ x=1 \\ x=\frac{1}{2} \end{cases}$$

Signo de  $f'(x)$ :

$$\begin{array}{ccccccc} & f' < 0 & & f' > 0 & & f' < 0 & & f' > 0 \\ & \searrow & 0 & \nearrow & \frac{1}{2} & \searrow & 1 & \nearrow \\ & & & & & & & \end{array}$$

$f(x)$  es decreciente en  $(-\infty, 0) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ ; es creciente en  $\left(0, \frac{1}{2}\right) \cup (1, +\infty)$ . Tiene un máximo en  $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{16}\right)$  y dos mínimos:  $(0, 0)$  y  $(1, 0)$ .

• Segunda derivada:

$$f'(x) = 10x(x-1)(2x-1) = 20x^3 - 30x^2 + 10x$$

$$f''(x) = 60x^2 - 60x + 10 = 10(6x^2 - 6x + 1)$$

$$f''(x)=0 \rightarrow 6x^2 - 6x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{6 \pm \sqrt{36-24}}{12} = \frac{6 \pm \sqrt{12}}{12} \rightarrow \begin{cases} x \approx 0,21 \\ x \approx 0,79 \end{cases}$$

Signo de  $f''(x)$ :

$$\begin{array}{ccccccc} & f'' > 0 & & f'' < 0 & & f'' > 0 & \\ & \cup & 0,21 & \cap & 0,79 & \cup & \\ & & & & & & \end{array}$$

$f(x)$  es cóncava en  $(-\infty; 0,21) \cup (0,79; +\infty)$ ; es convexa en  $(0,21; 0,79)$ . Tiene dos puntos de inflexión:  $(0,21; 0,14)$  y  $(0,79; 0,14)$ .

### CÁLCULO DE PARÁMETROS

**EJERCICIO 6 : Halla los valores de a y b en la función  $f(x) = x^2 + ax + b$  sabiendo que pasa por el punto  $P(-2,1)$  y tiene un extremo relativo en el punto de abscisa  $x = -3$**

Solución:

Si pasa por el punto  $(-2, 1) \Rightarrow f(-2) = 1 \Rightarrow (-2)^2 + a(-2) - b = 1 \Rightarrow -a - b = -3$

Como tiene un extremo para  $x = -3 \Rightarrow f'(-3) = 0 \Rightarrow f'(x) = 2x + a \Rightarrow 2(-3) + a = 0 \Rightarrow a = 6$

Resolviendo el sistema: Como  $a = 6$ ,  $b = -3$

**EJERCICIO 7 :** Halla a, b y c en la función  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  sabiendo que el punto P(0,4) es un máximo y el punto Q(2,0) es un mínimo.

Solución:

$$\begin{aligned} \text{Máximo en P(0,4)} &\Rightarrow \begin{cases} \text{Pasa por el punto (0,4)} \Rightarrow f(0) = 4 \Rightarrow a \cdot 0^3 + b \cdot 0^2 + c \cdot 0 + d = 4 \Rightarrow d = 4 \\ \text{Máximo en } x = 0 \Rightarrow \begin{cases} f'(0) = 0 \\ f(x) = 3ax^2 + 2bx + c \end{cases} \Rightarrow 3a \cdot 0^2 + 2b \cdot 0 + c = 0 \Rightarrow c = 0 \end{cases} \\ \text{Mínimo en Q(2,0)} &\Rightarrow \begin{cases} \text{Pasa por el punto (2,0)} \Rightarrow f(2) = 0 \Rightarrow a \cdot 2^3 + b \cdot 2^2 + c \cdot 2 + d = 0 \Rightarrow 8a + 4b + 2c + d = 0 \\ \text{Mínimo en } x = 2 \Rightarrow \begin{cases} f'(2) = 0 \\ f(x) = 3ax^2 + 2bx + c \end{cases} \Rightarrow 3a \cdot 2^2 + 2b \cdot 2 + c = 0 \Rightarrow 12a + 4b + c = 0 \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

Formando un sistema con las 4 ecuaciones obtenidas resulta:

$$\begin{cases} d = 4 \\ 8a + 4b + 2c + d = 0 \\ c = 0 \\ 12a + 4b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8a + 4b = -4 \\ 12a + 4b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + b = -1 \\ 3a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2a - b = 1 \\ 3a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 1; b = -3$$

### PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN

**EJERCICIO 8 :** La suma de tres números positivos es 60. El primero más el doble del segundo más el triple del tercero suman 120. Halla los números que verifican estas condiciones y cuyo producto es máximo.

Solución:

Llamamos  $x$  al primer número,  $y$  al segundo y  $z$  al tercero. Así, tenemos que:

$$\begin{cases} x + y + z = 60 & (x, y, z > 0) \\ x + 2y + 3z = 120 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 60 - z \\ x + 2y = 120 - 3z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = 60 - 2z \end{cases}$$

El producto de los tres números es:  $P = x \cdot y \cdot z = z \cdot (60 - 2z) \cdot z = z^2(60 - 2z) = f(z)$ ,  $z > 0$

Buscamos  $z$  para que  $f(z)$  sea máximo:

$$f'(z) = 2z(60 - 2z) + z^2 \cdot (-2) = 2z(60 - 2z - z) = 2z(60 - 3z) = 120z - 6z^2$$


$$f'(z) = 0 \rightarrow \begin{cases} z = 0 & (\text{no vale, pues ha de ser } z > 0) \\ z = 20 \end{cases}$$

Veamos que en  $z = 20$  hay un máximo:  $f''(z) = 120 - 12z$ ;  $f''(20) = -120 < 0 \rightarrow$  hay un máximo

Por tanto, el producto es máximo para  $x = 20$ ,  $y = 20$ ,  $z = 20$ .

**EJERCICIO 9 :** Entre todos los triángulos rectángulos de hipotenusa 5 metros, determina razonadamente el que tiene área máxima.

Solución:



$$\text{Área} = \frac{x \sqrt{25 - x^2}}{2} = f(x), \quad 0 < x < 5$$

Buscamos  $x$  para que el área sea máxima:  $f(x) = \frac{\sqrt{25x^2 - x^4}}{2}$

$$f'(x) = \frac{50x - 4x^3}{4\sqrt{25x^2 - x^4}} = \frac{25x - 2x^3}{2\sqrt{25x^2 - x^4}} = \frac{x(25 - 2x^2)}{2x\sqrt{25 - x^2}} = \frac{25 - 2x^2}{2\sqrt{25 - x^2}}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 25 - 2x^2 = 0 \rightarrow x^2 = \frac{25}{2} \rightarrow \begin{cases} x = -\frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ (no vale)} \\ x = \frac{5\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

(Como  $f'(x) > 0$  a la izquierda de  $x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$  y  $f'(x) < 0$  a su derecha, en  $x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$  hay un máximo).

Por tanto, el área es máxima cuando los dos catetos miden  $x = \frac{5\sqrt{2}}{2}$  metros.

**EJERCICIO 10 :** Un móvil se desplaza según la función:  $e(t) = 600t + 150t^3 - 115t^4 + 27t^5 - 2t^6$ , que nos da el espacio en metros recorrido por el móvil en  $t$  minutos.  
**Determina a cuántos metros de la salida está el punto en el que alcanza la máxima velocidad.**

*Solución:*

La función que nos da la velocidad es la derivada de  $e(t)$ :

$$e'(t) = 600 + 450t^2 - 460t^3 + 135t^4 - 12t^5 = v(t)$$

Para obtener el máximo de la velocidad, derivamos  $v(t)$ :

$$v'(t) = 900t - 1380t^2 + 540t^3 - 60t^4 = 60t(15 - 23t + 9t^2 - t^3) = -60t(t-1)(t-3)(t-5)$$


$$v'(t) = 0 \rightarrow t = 0, t = 1, t = 3, t = 5$$

Obtenemos el valor de  $v(t)$  en estos puntos:  $v(0) = 600$ ,  $v(1) = 713$ ,  $v(3) = 249$ ,  $v(5) = 1225$

Por tanto, la máxima velocidad se alcanza en el minuto  $t = 5$  y el espacio recorrido es  $e(5) = 3000$  m.

**EJERCICIO 11 :** Un granjero desea vallar un terreno rectangular de pasto adyacente a un río. El pastizal debe tener  $180\,000 \text{ m}^2$  para producir suficiente forraje para su ganado.  
**¿Qué dimensiones tendrá el terreno rectangular de forma que utilice la mínima cantidad de valla, si el lado que da al río no necesita ser vallado?**

*Solución:*



$$\text{Área} = xy = 180\,000 \text{ m}^2 \rightarrow y = \frac{180\,000}{x}$$

$$\text{Cantidad de valla necesaria: } f(x) = 2x + y = 2x + \frac{180\,000}{x}, \quad x > 0$$

Buscamos  $x > 0$  que haga  $f(x)$  mínima:

$$f'(x) = 2 - \frac{180\,000}{x^2}$$


$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x^2 - 180\,000 = 0 \rightarrow x^2 = 90\,000 \rightarrow \begin{cases} x = -300 \text{ (no vale)} \\ x = 300 \end{cases}$$

Veamos que en  $x = 300$  hay un mínimo:  $f''(x) = \frac{360\,000}{x^3}$ ;  $f''(300) > 0 \rightarrow$  hay un mínimo

Por tanto, han de ser:  $x = 300$  m,  $y = 600$  m

**EJERCICIO 12 :** Entre todos los triángulos rectángulos de área 5 cm<sup>2</sup>, determina las longitudes de los lados del que tiene la hipotenusa mínima.

Solución:



$$\text{Área} = x \cdot y = 10 \rightarrow y = \frac{10}{x}, x > 0$$

$$\text{Hipotenusa} = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + \frac{100}{x^2}}$$

Buscamos el valor de  $x > 0$  que hace mínima la función:  $f(x) = \sqrt{x^2 + \frac{100}{x^2}}$

Derivamos:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + \frac{100}{x^2}}} \cdot \left(2x - \frac{200}{x^3}\right)$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow 2x - \frac{200}{x^3} = 0 \rightarrow 2x^4 - 200 = 0 \rightarrow x^4 = 100 \rightarrow x = \sqrt[4]{100} = \sqrt{10} \rightarrow y = \sqrt{10}$$

(Como  $f'(x) < 0$  a la izquierda de  $\sqrt{10}$  y  $f'(x) > 0$  a su derecha, en  $x = \sqrt{10}$  hay un mínimo).

Por tanto, los catetos miden  $\sqrt{10}$  cm cada uno; y la hipotenusa medirá  $\sqrt{20}$  cm.

## CÁLCULO DE LÍMITES

**EJERCICIO 13 :** Calcular los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x + \sin x}$    b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x^3 + 3x^2}$    c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2 \sin x}{x + \sin x}$    d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - 4 \cos x}{x^2}$    e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x \cos x + \sin x}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$    g)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (xLx)$    h)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sin^2 x}$    i)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$    j)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$    k)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$

Solución:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x + \sin x} = \left(\frac{0}{0}\right)^{LH} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x^3 + 3x^2} = \left(\frac{0}{0}\right)^{LH} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{3x^2 + 6x} = \left(\frac{0}{0}\right)^{LH} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \cos x - x \sin x}{6x + 6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 2 \sin x}{x + \sin x} = \left(\frac{0}{0}\right)^{LH} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2 \cos x}{1 + \cos x} = \frac{2 - 2}{1 + 1} = 0$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - 4 \cos x}{x^2} = \left(\frac{0}{0}\right)^{LH} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{x} = \left(\frac{0}{0}\right)^{LH} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x}{1} = 2$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x \cos x + \sin x} = \left(\frac{0}{0}\right)^{LH} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{\cos x - x \sin x + \cos x} = \frac{0}{2} = 0$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} = \left(\frac{a^0 - b^0}{0} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot La - b^x \cdot Lb}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} (a^x La - b^x Lb) = a^0 La - b^0 Lb = La - Lb$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0^+} (xLx) = (0, \infty) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{Lx}{1/x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sin^2 x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2 \sin x \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin 2x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos 2x \cdot 2} = \frac{0}{2} = 0$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 \cdot \sin x + x \cos x}{\sin x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + 1 \cdot \cos x + (-\sin x) \cdot x}{\cos x} = \frac{2}{1} = 2$$

$$j) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln x^x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \cdot \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln x}{1/x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x}} \stackrel{L'H}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} -x} = e^0 = 1$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \left( \frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2$$

**TEOREMAS DE DERIVABILIDAD**

**EJERCICIO 14 :** Comprueba que la función  $f(x) = x^2 + 2x - 1$  cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo  $[-3, 1]$ . ¿Dónde cumple la tesis?

Solución:

- La función  $f(x) = x^2 + 2x - 1$  es continua y derivable en todo  $\mathbf{R}$ ; por tanto, será continua en  $[-3, 1]$  y derivable en  $(-3, 1)$ .
- Además:  $\begin{cases} f(-3) = 2 \\ f(1) = 2 \end{cases}$  son iguales.
- Por tanto, se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle. Así, sabemos que existe  $c \in (-3, 1)$  tal que  $f'(c) = 0$ .
- Veamos dónde se cumple la tesis:  $f'(x) = 2x + 2 \rightarrow f'(c) = 2c + 2 \rightarrow c = -1 \in (-3, 1)$

**EJERCICIO 15 :** Calcula  $m$  y  $n$  para que la función:  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2x + m & \text{si } x \leq 1 \\ nx - 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

cumpla las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo  $[0, 2]$ . ¿Dónde cumple la tesis?

Solución:

- Continuidad en  $[0, 2]$ :
  - Si  $x \neq 1$ , la función es continua, pues está formada por polinomios, que son funciones continuas.
  - En  $x = 1$ :  $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (3x^2 - 2x + m) = 1 + m \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (nx - 2) = n - 2 \\ f(1) = 1 + m \end{cases} \Rightarrow$  Para que sea continua en, ha de ser  $1 + m = n - 2$
- Derivabilidad en  $(0, 2)$ :
  - Si  $x \neq 1$ , la función es derivable, y su derivada es:  $f'(x) = \begin{cases} 6x - 2 & \text{si } x < 1 \\ n & \text{si } x > 1 \end{cases}$
  - Para que sea derivable en  $x = 1$ , han de coincidir las derivadas laterales:  $\begin{cases} f'(1^-) = 4 \\ f'(1^+) = n \end{cases} n = 4$
- Por tanto,  $f(x)$  cumplirá las hipótesis del teorema del valor medio en  $[0, 2]$  si:
 
$$\begin{cases} 1 + m = n - 2 \\ n = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ n = 4 \end{cases}$$

Este caso quedaría:  $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 4x - 2 & \text{si } x > 1 \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} 6x - 2 & \text{si } x \leq 1 \\ 4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Veamos dónde cumple la tesis:

$$f'(c) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{6 - 1}{2} = \frac{5}{2} \Rightarrow f'(c) = 6c - 2 = \frac{5}{2} \rightarrow c = \frac{3}{4} \in (0, 2) \text{ (si } c > 1)$$

**EJERCICIO 16 :** Comprueba que la función:  $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ -4x + 5 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

satisface las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo  $[0, 3]$ . ¿Dónde cumple la tesis?

*Solución:*

• Continuidad en  $[0, 3]$ :

- Si  $x \neq 2$ , la función es continua, pues está formada por polinomios, que son funciones continuas.

$$\text{- En } x = 2: \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x^2 + 1) = -3 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-4x + 5) = -3 \\ f(2) = -3 \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) \\ f(x) \text{ es continua en } x = 2. \end{array} \right.$$

Por tanto,  $f(x)$  es continua en  $[0, 3]$ .

• Derivabilidad en  $(0, 3)$ :

- Si  $x \neq 2$ , la función es derivable, y su derivada es:  $f'(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x < 2 \\ -4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

- En  $x = 2$ , como  $f'(2^-) = f'(2^+) = -4$ , también es derivable; y  $f'(2) = -4$ .

Por tanto,  $f(x)$  es derivable en  $(0, 3)$ .

• Se cumplen las hipótesis del teorema del valor medio en  $[0, 3]$ ; por tanto, existe  $c \in (0, 3)$  tal

$$\text{que: } f'(c) = \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{-7 - 1}{3 - 0} = \frac{-8}{3}$$

$$\text{Veamos dónde se cumple la tesis: } -2x = \frac{-8}{3} \rightarrow x = \frac{4}{3} \rightarrow c = \frac{4}{3} \in (0, 3)$$

**EJERCICIO 17 :** Calcula los valores de  $a$ ,  $b$  y  $c$  para que la función:  $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ bx + c & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

cumpla las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo  $[-2, 2]$ . ¿Qué asegura el teorema en este caso?

*Solución:*

• Continuidad en  $[-2, 2]$ :

- Si  $x \neq 1$ , la función es continua, pues está formada por polinomios, que son funciones continuas.

$$\text{- En } x = 1: \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax) = 1 + a \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (bx + c) = b + c \Rightarrow \text{Para que sea continua en } x = 1, \text{ ha de ser } 1 + a = b + c. \\ f(1) = b + c \end{array} \right.$$

• Derivabilidad en  $(-2, 2)$ :

- Si  $x \neq 1$ , la función es derivable, y su derivada es:  $f'(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } -2 < x < 1 \\ b & \text{si } 1 < x < 2 \end{cases}$

$$\text{- En } x = 1, \text{ han de ser iguales las derivadas laterales: } \left. \begin{array}{l} f'(1^-) = 2 + a \\ f'(1^+) = b \end{array} \right\} 2 + a = b$$

• Además, debe ser  $f(-2) = f(2)$ ; es decir:  $4 - 2a = 2b + c$

$$\left. \begin{array}{l} 1 + a = b + c \\ 2 + a = b \\ 4 - 2a = 2b + c \end{array} \right\} \begin{array}{l} a = \frac{1}{4} \\ b = \frac{9}{4} \\ c = -1 \end{array}$$

• En este caso, el teorema de Rolle asegura que existe  $c \in (-2, 2)$  tal que  $f'(c) = 0$ .

**EJERCICIO 18 :** Comprueba que la función  $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$  cumple las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo  $[-1, 2]$ . ¿Dónde cumple la tesis?

*Solución:*

- La función  $f(x) = 3x^2 - 6x + 7$  es continua y derivable en  $\mathbf{R}$ ; por tanto, será continua en  $[-1, 2]$  y derivable en  $(-1, 2)$ . Luego, cumple las hipótesis del teorema del valor medio.
- Entonces, existe  $c \in (-1, 2)$  tal que:  $f'(c) = \frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{7 - 16}{2 + 1} = \frac{-9}{3} = -3$

Veamos cuál es el valor de  $c$  en el que se cumple la tesis:  $f'(x) = 6x - 6 \rightarrow f'(c) = 6c - 6 = -3 \rightarrow 6c = 3 \Rightarrow c = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ . La tesis se cumple en  $c = \frac{1}{2} \in (-1, 2)$

**EJERCICIO 19 :** La función  $f: [-1,1] \rightarrow \mathbf{R}$  definida por  $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$  toma el valor en los extremos del intervalo,  $f(-1) = 1$ ;  $f(1) = 1$ . Encontrar su derivada y comprobar que no se anula nunca. ¿Contradice esto el teorema de Rolle?

*Solución:*

- 1) ¿f continua en  $[-1,1]$ ? : Cierto porque f es continua en todo  $\mathbf{R}$
- 2) ¿f derivable en  $(-1,1)$ ? :  $f'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$   $\Rightarrow$  Falsa porque f no se derivable en  $x = 0 \Rightarrow$  No es cierta

Esto no contradice el teorema de Rolle porque la segunda hipótesis no se verifica.

**EJERCICIO 20 :** Calcula b para que la función  $f(x) = x^3 - 4x + 3$  cumpla las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo  $[0,b]$ . ¿Dónde se cumple la tesis?

*Solución:*

- 1) ¿f continua en  $[0,b]$ ? : Cierto porque f es continua en todo  $\mathbf{R}$ .
- 2) ¿f derivable en  $(0,b)$ ? :  $f'(x) = 3x^2 - 4$  cierto porque f es derivable en todo  $\mathbf{R}$
- 3) ¿f(0) = f(b)? :  
 $f(0) = 3$ ;  $f(b) = b^3 - 4b + 3 = 3 \Rightarrow b^3 - 4b = 0 \Rightarrow b(b^2 - 4) = 0$

Cuyas soluciones son  $b = 0$ ;  $b = 2$ ;  $b = -2$  : La única solución válida es  $b = 2$ .

¿Dónde se cumple la tesis?:  $f'(x) = 3x^2 - 4$ ;  $f'(c) = 3c^2 - 4 = 0 \Rightarrow c = \frac{2}{\sqrt{3}}$

**EJERCICIO 21 :** Comprueba que la función  $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } -1/2 \leq x < 1 \\ 5 - (x-2)^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$  cumple las hipótesis del Teorema de Rolle. Si las cumple, averiguar dónde cumple la tesis

*Solución:*

- 1) ¿f continua en  $[-1/2,4]$ ?  
f continua en  $[-1/2,4] - \{1\}$  por composición de funciones continuas  
En  $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 2) = 4 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} [5 - (x - 2)^2] = 4 \end{cases}$$

$$f(1) = 5 - (1 - 2)^2 = 4$$

Por tanto f continua en  $x = 1$ . Por tanto f continua en  $[-1/2,4]$  y se cumple la primera hipótesis



2) ¿f derivable en  $(-1/2, 4)$ ?

$$f'(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } -1/2 \leq x < 1 \\ -2x + 4 & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

f derivable en  $(-1/2, 4) - \{1\}$  por composición de funciones derivables.

En  $x = 1$ :

$$f'(1^-) = 2$$

$$f'(1^+) = -2 \cdot 1 + 4 = 2$$

Las derivadas laterales son iguales, luego es derivable en  $x = 1$

Por tanto es derivable en  $(-1/2, 4)$  y se cumple la 2ª hipótesis.

3) ¿f  $(-1/2) = f(4)$ ?

$$f(-1/2) = 2(-1/2) + 2 = 1$$

$$f(4) = -4^2 + 4 \cdot 4 + 1 = 1$$

Como toma el mismo valor en los extremos del intervalo, se cumple la 3ª hipótesis.

**Por tanto cumple las hipótesis del Teorema de Rolle.**

Veamos dónde se verifica la tesis:  $c \in (-1/2, 4)$  tal que  $f'(c) = 0$

$$f'(c) = \begin{cases} 2 & \text{si } -1/2 \leq c < 1 \\ -2c + 4 & \text{si } 1 \leq c \leq 4 \end{cases}$$

Haciendo  $f'(c) = 0$ , resulta:

$$0 = 2 \text{ que es absurdo.}$$

$$0 = -2c + 4, \text{ es decir, } c = 2, \text{ porque pertenece a } (-1/2, 4)$$

**La tesis se verifica en  $c = 2$**

**EJERCICIO 22 : Siendo  $f(x) = (x - 2)^2(x + 1)$ , hallar un número c, en el intervalo  $(0, 4)$  de modo que se verifique el teorema del valor medio.**

*Solución:* Como es una función polinómica, es continua y derivable en todo R, luego podemos aplicar el teorema:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \Rightarrow \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = f'(c)$$

$$f(4) = (4 - 2)^2(4 + 1) = 20$$

$$f(0) = (0 - 2)^2(0 + 1) = 4$$

$$f'(x) = 2(x - 2)(x + 1) + 1 \cdot (x - 2)^2 = (x - 2)[2(x + 1) + (x - 2)] = (x - 2)3x \Rightarrow f'(c) = (c - 2)3c$$

$$\frac{20 - 4}{4 - 0} = (c - 2)3c \Rightarrow 3c^2 - 6c = 4 \Rightarrow 3c^2 - 6c - 4 = 0$$

$$c = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 48}}{6} = \frac{6 \pm \sqrt{84}}{6} = \frac{6 \pm 2\sqrt{21}}{6} = \begin{cases} 1 + \sqrt{21}/3 \\ 1 - \sqrt{21}/3 \end{cases} \text{ La solución válida es la } 1^{\text{a}} \text{ porque tiene que estar entre 0 y 4}$$

**EJERCICIO 23 : Prueba que la función  $f(x) = \begin{cases} \frac{3-x^2}{2} & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$  satisface las hipótesis del teorema del valor**

**medio en el intervalo  $[0, 2]$  y calcula el o los valores vaticinados por el teorema.**

*Solución:*

1) ¿f continua en  $[0, 2]$ ?

f continua en  $[0,2] - \{1\}$

En  $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3-x^2}{2} = \frac{3-1^2}{2} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{Por tanto } f \text{ continua en } x = 1$$

$$f(1) = 1/1 = 1$$

f continua en  $[0,2]$  y se cumple la primera hipótesis

$$2) \text{ ¿f derivable en } (0,2)? f'(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 1 \\ -\frac{1}{x^2} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

f derivable en  $(0,2) - \{1\}$  por composición de funciones derivables.

En  $x = 1$

$$f'(1^-) = -1$$

$$f'(1^+) = -1$$

f derivable en  $x = 1$

Por tanto derivable en  $(0,2)$  y se cumplen la segunda hipótesis

**Satisface las dos hipótesis del teorema del valor medio**

$$\text{Tesis: Existe un } c \in (0,2) \text{ tal que : } \frac{f(2)-f(0)}{2-0} = f'(c)$$

$$f(2) = 1/2 ; f(0) = 3/2 , f'(c) = \begin{cases} -c & \text{si } c < 1 \\ -1/c^2 & \text{si } c \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{luego } \frac{1/2 - 3/2}{2-0} = \begin{cases} -c & \text{si } c < 1 \\ -1/c^2 & \text{si } c \geq 1 \end{cases}$$

De la primera ecuación se obtiene:  $-1/2 = -c \Rightarrow c = 1/2 \in (0,2) \Rightarrow$  Una solución válida  $c = 1/2$

Y de la segunda ecuación:  $-1/2 = -1/c^2 \Rightarrow c^2 = 2 \Rightarrow c = \sqrt{2} \in (0,2) \Rightarrow$  Otra solución válida  $c = \sqrt{2}$

**EJERCICIO 24 : Aplica el teorema de Cauchy a las funciones  $f(x) = x^2 - 2$ ;  $g(x) = 3x^2 + x - 1$  en el intervalo  $[0,4]$**

*Solución:*

Las funciones son continuas y derivables por tratarse de funciones polinómica, por tanto,

$$f'(x) = 2x ; f'(c) = 2c$$

$$g'(x) = 6x + 1 ; g'(c) = 6c + 1$$

Valores de las funciones en los extremos de los intervalos:

$$f(0) = -2 ; f(4) = 14$$

$$g(0) = -1 ; g(4) = 51$$

$$\text{Entonces, } \frac{14 - (-2)}{51 - (-1)} = \frac{2c}{6c + 1} \Rightarrow \frac{16}{52} = \frac{2c}{6c + 1} \Rightarrow \frac{4}{13} = \frac{2c}{6c + 1}$$

es decir,  $24c + 4 = 26c \Rightarrow 2c = 4 \Rightarrow c = 2 \in (0,4)$

**La tesis se verifica en  $c = 2$**