

# MATEMÁTICAS II

## 2º Bachillerato Capítulo

### 10b: Integral definida.

#### Propiedad Intelectual

El presente documento se encuentra depositado en el registro de Propiedad Intelectual de Digital Media Rights con ID de obra AAA-0181-02-AAA-069505

Fecha y hora de registro: 2015-07-09 13:38:10.0

Licencia de distribución: CC by-nc-sa



Queda prohibido el uso del presente documento y sus contenidos para fines que excedan los límites establecidos por la licencia de distribución.

Más información en <http://www.dnrights.com>



LibrosMareaVerde.tk

[www.apuntesmareaverde.org.es](http://www.apuntesmareaverde.org.es)



**Autores:** Leticia González Pascual y Álvaro Valdés Menéndez

**Revisores:** María Molero y Javier Rodrigo

Todas las imágenes han sido creadas por los autores utilizando *software* libre (GeoGebra y GIMP)

## Índice

**4. INTEGRAL DEFINIDA**

- 4.1. ÁREA BAJO UNA CURVA
- 4.2. LA INTEGRAL DEFINIDA
- 4.3. TEOREMA DEL VALOR MEDIO DEL CÁLCULO INTEGRAL
- 4.4. FUNCIÓN INTEGRAL O FUNCIÓN ÁREA
- 4.5. TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO INTEGRAL
- 4.6. REGLA DE BARROW
- 4.7. APLICACIONES DE LA INTEGRAL DEFINIDA
  - Área encerrada bajo una curva
  - Área comprendida entre curvas
  - Volumen de un sólido de revolución

**Resumen**

A estas alturas de tu vida estudiantil has aprendido muchos símbolos matemáticos. Posiblemente este sea el último que aprenderás en el instituto, el símbolo de integral:



Fue introducido por el matemático alemán *Gottfried Leibniz* en 1675, basándose en la palabra latina *summa*, 'suma', escrito *fumma*, tomando sólo la inicial. Por tanto, este símbolo es una S, y la integral no deja de representar una suma.

El término "Cálculo integral", por su parte, fue introducido por *Jakob Bernoulli* en 1690.

## Actividades de introducción

- ✚ *Calcula el área de la región limitada por la función  $f(x) = x$  entre el origen de coordenadas y un punto genérico de abscisa  $x$ .*


### Solución:

Si representamos la función  $f(x) = x$  y dibujamos la superficie entre ella y el eje  $OX$ , obtenemos el triángulo rectángulo de la figura.

Sabemos que el área del triángulo es:  $\text{Área} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$

Tanto la base como la altura valen  $x$  unidades, por tanto:

$$\text{Área} = \frac{x \cdot x}{2} = \frac{x^2}{2}$$



Por tanto, el área bajo la curva  $f(x) = x$  se calcula como  $A(x) = \frac{x^2}{2}$ .

- ✚ *Calcula el área de la región limitada por la función  $f(x) = 3 + x$  entre el origen de coordenadas y un punto genérico de abscisa  $x$ .*

### Solución:


Como antes, representamos la función  $f(x) = 3 + x$  y dibujamos la superficie entre ella y el eje  $OX$ . Ahora obtenemos el trapecio rectángulo de la figura.

Si dividimos la figura en un rectángulo de altura  $3$  u y un triángulo, el área se calcula como:

$$\text{Área} = 3 \cdot x + \frac{x \cdot x}{2} = 3x + \frac{x^2}{2}$$

Por tanto, el área bajo la curva  $f(x) = 3 + x$  se calcula como:

$$A(x) = 3x + \frac{x^2}{2}$$



- ✚ *Repita los procedimientos anteriores para calcular el área de la región limitada por las funciones  $f(x) = a$ ,  $f(x) = a \cdot x$  y  $f(x) = a \cdot x + b$  (con  $a$  y  $b \in \mathbb{R}$ ) entre el origen de coordenadas y un punto genérico de abscisa  $x$ .*

### Analiza:

- Deriva las expresiones obtenidas en los ejercicios anteriores y razona qué relación hay entre las funciones  $A(x)$  y  $f(x)$ .
- Recuerda la interpretación de área como "suma de las unidades cuadradas encerradas por una figura". Aplícala para determinar el área de la función  $f(x) = 16 - x^2$ , representándola en una cuadrícula y contando el número de cuadrados bajo ella para diferentes valores de  $x$ .
- Razona qué ocurre con el área cuando la función  $f(x)$  es negativa en el intervalo analizado.

## 4. EL PROBLEMA DEL CÁLCULO DEL ÁREA

### 4.1. Área bajo una curva

Dada una función  $f(x)$  continua y no negativa en un intervalo  $[a, b]$ , su gráfica determina una región del plano que vendrá limitada por la función, el eje de abscisas y las rectas  $x = a$  y  $x = b$ .



Veamos cómo podemos calcular de forma aproximada el **área** de dicha región:

Tomamos una partición del intervalo  $[a, b]$ . Consiste en dividir el intervalo en  $n$  partes, tomando para ello los puntos  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  verificando  $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ .


Así, tenemos los intervalos  $[a, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, b]$ .

A continuación, denotamos por  $m_i$  al mínimo valor que toma la función en el intervalo  $[x_{i-1}, x_i]$  y por  $M_i$  al máximo valor que toma la función en el mismo intervalo.

Así, en cada intervalo  $[x_{i-1}, x_i]$  consideraremos dos posibles figuras, la creada con rectángulos de base  $x_i - x_{i-1}$  y altura  $m_i$  y la creada con rectángulos de base  $x_i - x_{i-1}$  y altura  $M_i$ . Sumando las áreas de los  $n$  rectángulos, obtenemos:



Suma inferior



Suma superior

En el primer caso obtenemos una **aproximación por defecto** del área encerrada bajo la curva:

$$s = m_1(x_1 - x_0) + m_2(x_2 - x_1) + \dots + m_n(x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1})$$

Esta suma se denomina **suma inferior** de la partición en el intervalo  $[a, b]$ .

En el segundo caso obtenemos una **aproximación por exceso** del área encerrada bajo la curva.

$$S = M_1(x_1 - x_0) + M_2(x_2 - x_1) + \dots + M_n(x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$$

Esta suma se denomina **suma superior** de la partición en el intervalo  $[a, b]$ .

Hemos obtenido dos aproximaciones del área  $A$ , una por defecto  $s$  y otra por exceso  $S$ . Se tiene que


$$s \leq A \leq S$$

Si tenemos una partición  $P_1$  del intervalo  $[a, b]$ , con suma inferior  $s_1$  y suma superior  $S_1$ , diremos que otra partición  $P_2$  del intervalo  $[a, b]$  es más fina que  $P_1$  si contiene todos los puntos de la partición  $P_1$  y además otros puntos nuevos.

Para dicha partición  $P_2$ , tenemos una suma inferior  $s_2$  y una suma superior  $S_2$ . Se verifica que:

$$s_1 \leq s_2 \leq A \leq S_2 \leq S_1$$

Es decir, al tomar una partición más fina, la suma inferior aumenta (siendo todavía menor o igual que el valor del área) y la suma superior disminuye (siendo mayor o igual que el valor del área).




Esto significa que cuanto más fina sea la partición, más nos acercamos al verdadero valor del área.

Considerando una sucesión de particiones cada una más fina que la anterior,  $P_1, P_2, \dots, P_n, P_{n+1}, \dots$ , obtendremos  $s_1, s_2, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots$  la sucesión de áreas por defecto y  $S_1, S_2, \dots, S_n, S_{n+1}, \dots$  la sucesión de áreas por exceso.

Cuando  $n \rightarrow \infty$ , la longitud de los intervalos de la partición se hace cada vez más pequeña, luego  $x_i - x_{i-1} \rightarrow 0$ . Así, cuando la función sea integrable, las sumas inferiores y superiores tenderán al área:

$$S_n - s_n \rightarrow 0$$

Esto significa que  $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - s_n) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ , y de aquí:  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = A$



Suma inferior y superior con la partición  $P_1$

Suma inferior y superior con la partición  $P_2$

Área

## 4.2. Integral definida

Sea una función  $f(x)$  continua y no negativa en un intervalo  $[a, b]$ .

Definimos la **integral definida** entre  $a$  y  $b$  de  $f(x)$  como la expresión

$$\int_a^b f(x) dx$$

Su valor es el **área comprendida entre la gráfica** de  $f(x)$ , el eje de abscisas y las rectas  $x = a$  y  $x = b$ .

Los valores  $a$  y  $b$  se llaman **límites de integración**.



Hemos visto que dada una sucesión de particiones  $P_1, P_2, \dots, P_n, P_{n+1}, \dots$  del intervalo  $[a, b]$ , cada una más fina de la anterior, con sumas inferiores  $s_1, s_2, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots$  y sumas superiores  $S_1, S_2, \dots, S_n, S_{n+1}, \dots$ , se verifica que dichas sumas tenderán al verdadero valor del área.

Se tiene que:  $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ , es decir, que la integral se puede interpretar como:

“la suma del área de todos los rectángulos de altura  $f(x)$  y base infinitesimal ( $dx$ ) comprendidos entre  $a$  y  $b$ ”

### Propiedades:

- Si los límites de integración son iguales, la integral definida vale cero.  $\int_a^a f(x) dx = 0$
- Si la curva está por encima del eje  $X$  ( $f(x) > 0$ ), la integral es positiva,  $\int_a^b f(x) dx > 0$ , mientras que si la curva está por debajo del eje  $X$  ( $f(x) < 0$ ), se puede definir también la integral definida, que será negativa:  $\int_a^b f(x) dx < 0$ .



- Sea  $c \in (a, b)$ , entonces podemos descomponer la integral de la forma:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

- Si intercambiamos los límites de integración, la integral cambia de signo.

$$\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$$

- Dadas dos funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  continuas en el intervalo  $[a, b]$ , se tiene que:

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad \text{y} \quad \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

- Dada una función  $f(x)$  continua en el intervalo  $[a, b]$  y una constante  $k \in \mathbb{R}$ , se tiene que:

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

- Dadas dos funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  continuas en  $[a, b]$ , verificando  $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a, b]$ , se tiene:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

### 4.3. Teorema del valor medio del cálculo integral


Dada una función  $f$  continua en el intervalo  $[a, b]$ , entonces existe un punto  $c \in (a, b)$  tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b - a).$$

#### Interpretación geométrica:

Siendo la integral un área, la interpretación geométrica es simple:

Existe un punto  $c \in (a, b)$  tal que el área encerrada entre la curva, el eje de abscisas y las rectas  $x = a$  y  $x = b$  es igual al área de un rectángulo de base la amplitud del intervalo,  $b - a$ , y altura el valor que toma la función en el punto intermedio,  $f(c)$ .



#### Ejemplo:

Encuentra los valores de  $c$  que verifican  $\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b - a)$  siendo  $f(x)$  la semicircunferencia de centro el origen y radio 1, y  $a$  y  $b$  los puntos de corte de la misma con el eje  $OX$ .

Sabemos que la ecuación de la circunferencia en el plano es  $x^2 + y^2 = r^2$ , así que para el problema que se nos plantea tenemos que  $f(x) = +\sqrt{1 - x^2}$  y los puntos de corte con el eje son  $(-1, 0)$  y  $(+1, 0)$ .

Se trata de encontrar el rectángulo (azul) cuya área coincide con la de la semicircunferencia (roja), sabiendo que la base para ambas figuras está comprendida entre los puntos  $(-1, 0)$  y  $(+1, 0)$ .

Entonces, siendo:

$$A_{\text{rect}} = b \cdot h \quad \text{y} \quad A_{\text{circ}} = \pi \cdot r^2$$


Debe verificarse:

$$\frac{1}{2} \pi \cdot r^2 = b \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \pi \cdot 1^2 = 2 \cdot h \Rightarrow h = \frac{\pi}{4}$$

El valor de  $h$  corresponde a la variable  $y$ , pero nos piden un valor de  $x$ . Por tanto:

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow x^2 + h^2 = 1^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2} = \pm 0.61899$$

Que son los valores de  $c$  que nos piden.




### 4.4. Función integral o función área

Dada una función  $f$  continua en el intervalo  $[a, b]$ , para cualquier punto  $x \in [a, b]$  se define la **función integral** o **función área** como:

$$F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow F(x) = \int_a^x f(t) dt$$



#### 4.5. Teorema fundamental del cálculo integral

Sea  $f$  una función continua en el intervalo  $[a, b]$  y sea

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

con  $x \in [a, b]$  la función integral. Entonces  $F$  es derivable en  $(a, b)$  y

$$F'(x) = f(x)$$

para cualquier punto  $x \in (a, b)$ .

##### **Demostración:**

Aplicando la definición de derivada tenemos:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt}{h} =$$

Separando la primera integral en dos sumandos (propiedad 3):

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} =$$

Aplicando el teorema del valor medio del cálculo integral,  $\exists c \in (x, x+h)$  tal que


$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c) \cdot (x+h-x) = f(c) \cdot h$$

Así:

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c) \cdot h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(c)$$

Como  $c \in (x, x+h)$  y  $f$  es continua entonces  $\lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x)$  y, por tanto:  $F'(x) = f(x)$ .

#### Actividad resuelta

 Sin efectuar el cálculo de la integral indefinida, calcula  $f'(x)$  si  $f(x) = \int_0^x \frac{dt}{(1+t^2)^3}$

Aplicando el teorema fundamental del cálculo integral:

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{(1+t^2)^3} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{(1+x^2)^3}$$

##### **Generalización (1):**

Si en lugar de valores reales, los límites de integración son funciones reales de variable real, se aplica la regla de la cadena para obtener:

Sea  $f$  una función **continua** en el intervalo  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  y sea

$$F(x) = \int_a^{h(x)} f(t) dt$$

con  $x \in [a, b]$  la función integral. Si  $h(x)$  es **derivable**, entonces  $F$  es **derivable** en  $(a, b)$  y

$$F'(x) = f[h(x)] \cdot h'(x)$$

para cualquier punto  $x \in (a, b)$ .



**Generalización (2):**

Sea  $f$  una función **continua** en el intervalo  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  y sea

$$F(x) = \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt$$

con  $x \in [a, b]$  la función integral. Si  $h(x)$  y  $g(x)$  son derivables, entonces  $F$  es **derivable** en  $(a, b)$  y

$$F'(x) = f[h(x)] \cdot h'(x) - f[g(x)] \cdot g'(x)$$

para cualquier punto  $x \in (a, b)$ .

**Actividad resuelta**

✚ Sin efectuar el cálculo de la integral indefinida, calcula  $f'(x)$  si  $f(x) = \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{(1+t^2)^3}$

Aplicando el teorema fundamental del cálculo integral:

$$f(x) = \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{(1+t^2)^3} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{(1+(x^3)^2)^3} \cdot 3x^2 - \frac{1}{(1+(x^2)^2)^3} \cdot 2x = \frac{3x^2}{(1+x^6)^3} - \frac{2x}{(1+x^4)^3}$$

**4.6. Regla de Barrow**

Si  $f(x)$  es una función continua en el intervalo  $[a, b]$  y  $F(x)$  es una primitiva de  $f(x)$ , entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

y suele representarse como:

$$\int_a^b f(x) dx = (F(x)) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

**Demostración:**

Se tiene que  $F(x)$  es una primitiva de  $f(x)$ . Por otro lado, aplicando el teorema fundamental del cálculo integral,  $G(x) = \int_a^x f(t) dt$  también es una primitiva de  $f(x)$ . Al ser dos primitivas de la misma función, sólo se diferencian en una constante:

$$G(x) - F(x) = C \Rightarrow G(x) = F(x) + C$$

Evaluando las dos expresiones anteriores en el punto  $x = a$ , tenemos:

$$\left. \begin{array}{l} G(x) = F(x) + C \Rightarrow G(a) = F(a) + C \\ G(x) = \int_a^x f(t) dt \Rightarrow G(a) = \int_a^a f(t) dt = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow F(a) + C = 0 \Rightarrow C = -F(a)$$

Evaluando ahora dichas expresiones anteriores en el punto  $x = b$ , tenemos:

$$\left. \begin{array}{l} G(x) = F(x) + C \Rightarrow G(b) = F(b) + C \Rightarrow G(b) = F(b) - F(a) \\ G(x) = \int_a^x f(t) dt \Rightarrow G(b) = \int_a^b f(t) dt \end{array} \right\} \Rightarrow \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Entonces, para aplicar la Regla de Barrow se siguen los siguientes pasos:

1. Calculamos una primitiva  $F(x)$  de  $f(x)$
2. Hallamos los valores de esa función entre  $a$  y  $b$ :  $F(a)$  y  $F(b)$
3. Calculamos la integral  $\int_a^b f(x)dx = (F(x))\Big|_a^b = F(b) - F(a)$

**Ejemplos:**

$$\int_1^5 (-x^2 + 6x - 5)dx.$$

La función  $f(x) = -x^2 + 6x - 5$  es una función polinómica, luego es continua en todo  $\mathbb{R}$ , y por tanto es continua en el intervalo  $[1, 5]$ .

1. - Calculamos **una** primitiva de  $f(x)$ :

$$\int (-x^2 + 6x - 5)dx = -\frac{1}{3}x^3 + 6 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 5x$$

2. - Hallamos el valor de esa primitiva para los extremos del intervalo:  $F(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - 5x$

$$F(1) = -\frac{1^3}{3} + 3 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 = -\frac{1}{3} + 3 - 5 = -\frac{7}{3} \quad \text{y} \quad F(5) = -\frac{5^3}{3} + 3 \cdot 5^2 - 5 \cdot 5 = \frac{25}{3}$$

3. - Aplicamos la regla de Barrow:

$$\int_1^5 (-x^2 + 6x - 5)dx = F(5) - F(1) = \frac{25}{3} - \left(-\frac{7}{3}\right) = \frac{25}{3} + \frac{7}{3} = \frac{32}{3}$$

$$\int_{-2}^2 (x^2 - 4)dx.$$

La función  $f(x) = x^2 - 4$  es una función polinómica, luego es continua en todo  $\mathbb{R}$ , y por tanto es continua en el intervalo  $[-2, +2]$ .

1. - Calculamos **una** primitiva de  $f(x)$ :

$$\int_{-2}^2 (x^2 - 4)dx = \frac{1}{3}x^3 - 4x$$

2. - Hallamos el valor de esa primitiva para los extremos del intervalo y restamos:

$$\int_{-2}^2 (x^2 - 4)dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - 4x\right)\Big|_{-2}^{+2} = \left(\frac{1}{3}(+2)^3 - 4 \cdot (+2)\right) - \left(\frac{1}{3}(-2)^3 - 4 \cdot (-2)\right) = \frac{-16}{3} - \frac{16}{3} = \frac{-32}{3}$$

## Actividades propuestas

14. Resuelve las siguientes integrales definidas:

a)  $\int_0^6 (x^2 + x + 1)dx$

b)  $\int_{-1}^1 (x^2 + x + 1)dx$

c)  $\int_0^{\sqrt{3}} x\sqrt{x^2 + 1} dx$

d)  $\int_{-1}^1 \frac{x+1}{x^2 + 2x + 2} dx$

e)  $\int_0^{\pi} \sin x dx$

f)  $\int_1^e \ln x dx$

15. Halla el valor de  $c$  que verifica  $\int_0^5 (2x+1)dx = f(c) \cdot (5-0)$ , donde  $f(x) = 2x+1$ , y razona su interpretación geométrica.

16. Sin efectuar el cálculo de la integral indefinida, calcula  $f'(x)$  si  $f(x) = \int_2^{e^x} \frac{dt}{\ln x}$ .


## 4.7. Aplicaciones de la integral definida

### Área encerrada bajo una curva

Para calcular el área comprendida entre la gráfica de una función  $f(x)$  y el eje de abscisas en un intervalo en el que la gráfica aparece por encima y por debajo del eje  $X$ , es necesario hallar cada una de las áreas por separado.

En los subintervalos en los que la gráfica está por debajo del eje  $X$ , la integral será negativa, y tomaremos el valor absoluto en toda la integral.

$$\text{Área} = \left| \int_a^{x_1} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_2}^b f(x) dx \right| = |F(x_1) - F(a)| + |F(x_2) - F(x_1)| + |F(b) - F(x_2)|$$



Desde el punto de vista práctico, si tenemos la representación gráfica de la función se puede plantear el área como suma o resta de las regiones donde la función es positiva o negativa, respectivamente.

#### Ejemplo:

✚ Halla el área encerrada entre la gráfica de la función  $f(x) = x^2 - 2x - 3$ , el eje  $X$  y las rectas  $x = -3$  y  $x = 4$ .

La función  $f(x) = x^2 - 2x - 3$  es una función polinómica, luego es continua en todo  $\mathbb{R}$ , y por tanto es continua en el intervalo  $[-3, 4]$ .

La gráfica de  $f(x)$  es una parábola cóncava ( $\cup$ ).

Calculamos el vértice:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{2}{2} = 1 \quad \text{Si } x=1 \Rightarrow f(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 - 3 = -4$$

Tenemos:  $V(1, -4)$


Calculamos los puntos de corte de la función con el eje  $X$ .

Para ello, resolvemos la ecuación  $f(x) = 0$ :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1} = \\ &= \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2} = \begin{cases} 3 \rightarrow (3, 0) \\ -1 \rightarrow (-1, 0) \end{cases} \end{aligned}$$

Representando la función  $f(x) = x^2 - 2x - 3$  y las rectas  $x = -3$  y  $x = 4$  observamos que el área que queremos calcular se divide en tres regiones.

Hallamos una primitiva de  $f(x)$ :



$$\int (x^2 - 2x - 3) dx = \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x$$

Hemos obtenido tres regiones. El área total será la suma del área de cada región:

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \left| \int_{-3}^{-1} (x^2 - 2x - 3) dx \right| + \left| \int_{-1}^3 (x^2 - 2x - 3) dx \right| + \left| \int_3^4 (x^2 - 2x - 3) dx \right| = \\ &= |F(-1) - F(-3)| + |F(3) - F(-1)| + |F(4) - F(3)| = \left| \frac{5}{3} - (-9) \right| + \left| -9 - \frac{5}{3} \right| + \left| -\frac{20}{3} - (-9) \right| = \\ &= \frac{32}{3} + \frac{32}{3} + \frac{7}{3} = \frac{71}{3} u^2 \end{aligned}$$

Por tanto, el área de la región es igual a  $\frac{71}{3} u^2$

También podríamos plantear, ya que tenemos la representación gráfica de la función:

$$\text{Área} = \text{Área}_1 - \text{Área}_2 + \text{Área}_3 = \int_{-3}^{-1} (x^2 - 2x - 3) dx - \int_{-1}^3 (x^2 - 2x - 3) dx + \int_3^4 (x^2 - 2x - 3) dx$$

Es decir:

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \left( \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right) \Big|_{-3}^{-1} - \left( \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right) \Big|_{-1}^{+3} + \left( \frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right) \Big|_{+3}^{+4} = \dots \\ &= \left( \frac{5}{3} - (-9) \right) - \left( -9 - \frac{5}{3} \right) + \left( -\frac{20}{3} - (-9) \right) = \frac{32}{3} + \frac{32}{3} + \frac{7}{3} = \frac{71}{3} u^2 \end{aligned}$$

### Propiedades:

1. – Si la función es impar, la integral definida en un intervalo simétrico respecto al origen es nula:


$$\text{Si } f(x) \text{ es impar, } \int_{-a}^{+a} f(x) dx = 0$$

2. – Si la función es par, la integral definida en un intervalo simétrico respecto al origen es:


$$\text{Si } f(x) \text{ es par, } \int_{-a}^{+a} f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$$

Para entender estas dos propiedades nos basta con ver las gráficas de cada tipo de función.

- Si la función es impar, es simétrica respecto al origen de coordenadas y define dos recintos de signo opuesto e igual área a ambos lados del origen. Al sumarla, el resultado es nulo.
- Si la función es par, es simétrica respecto al eje  $OY$  y define dos recintos de igual signo e igual área.



Función impar



Función par


## Actividad resuelta

✚ *Calcula el área de un círculo de radio  $r$ .*

Podemos elegir la ubicación de la circunferencia, así que la centramos en el origen. Para este caso, la ecuación de una circunferencia de radio  $r$  es:

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$$

Podemos aprovechar la simetría del problema y calcular el área a partir del recinto del primer cuadrante:



$$A = 4 \cdot \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx$$

La primitiva se resuelve con el cambio:

$$x = r \cdot \operatorname{sen} t \Rightarrow dx = r \cdot \cos t \cdot dt$$

y proporciona:

$$\int \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \left( r^2 \operatorname{arcsen} \frac{x}{r} + x \cdot \sqrt{r^2 - x^2} \right) + C$$

Aplicando la regla de Barrow obtenemos:

$$A = 4 \cdot \int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = 2 \cdot \left( r^2 \operatorname{arcsen} \frac{x}{r} + x \cdot \sqrt{r^2 - x^2} \right) \Big|_0^r =$$

$$A = 2 \cdot \left( r^2 \operatorname{arcsen} \frac{r}{r} + r \cdot \sqrt{r^2 - r^2} - r^2 \operatorname{arcsen} \frac{0}{r} + 0 \cdot \sqrt{r^2 - 0} \right) = 2 \cdot \left( r^2 \cdot \frac{\pi}{2} - 0 \right)$$


Es decir, llegamos a la conocida fórmula:

$$A = \pi \cdot r^2$$

## Área comprendida entre dos curvas

El área comprendida entre las gráficas de las funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  en el intervalo  $[a, b]$  es igual que al área que se encierra entre la función diferencia  $(f - g)(x)$  y el eje  $X$  en ese intervalo.

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$



Siendo  $f(x) > g(x)$ . Si no se determina qué función está *por encima* de la otra, podemos escribir la expresión general:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Sin embargo, desde el punto de vista práctico, en el caso en el que las funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  tengan varios puntos de corte, será conveniente hallar las diferentes regiones y determinar las áreas por separado.

## Ejemplo:

✚ Halla el área comprendida entre las gráficas de las funciones  $f(x) = -x^2 + 4x$  y  $g(x) = x$  entre las rectas  $x = -1$  y  $x = 3$ .

Las representaciones gráficas de  $f(x)$  y  $g(x)$  son una parábola y una recta, respectivamente, así que es de esperar que haya dos cortes entre ellas y, por tanto, es posible que haya varias regiones diferenciadas a tener en cuenta.

La gráfica de  $f(x) = -x^2 + 4x$  es una parábola convexa. Hallamos su vértice:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \cdot (-1)} = \frac{-4}{-2} = 2 \quad \text{Si } x = 2 \Rightarrow f(2) = -2^2 + 4 \cdot 2 = -4 + 8 = 4 \Rightarrow V(2, 4)$$


Calculamos los puntos de corte de la función con el eje X, resolviendo la ecuación  $f(x) = 0$ :

$$f(x) = 0 \Rightarrow -x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow x \cdot (-x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases}$$

La gráfica de  $g(x) = x$  es una recta. Para dibujarla, basta con obtener dos puntos:

$x$	0	3
$y$	0	3

Para determinar la región de la que queremos calcular el área, la representamos, junto con los límites de integración:



Buscamos los puntos de corte entre las dos funciones, resolviendo la ecuación  $f(x) = g(x)$ :

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow -x^2 + 4x = x \Leftrightarrow -x^2 + 4x - x = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 3x = 0 \Leftrightarrow x(-x + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$$

Por tanto, el área que queremos calcular será:

$$\text{Área} = \int_{-1}^3 |(f - g)(x)| dx$$

Hallamos una primitiva de  $(f - g)(x)$ :

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = -x^2 + 4x - x = -x^2 + 3x \Rightarrow$$

$$\int (f - g)(x) dx = \int (-x^2 + 3x) dx = -\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2}$$

Hemos obtenido dos regiones. El área total será la suma del área de cada región:


$$\begin{aligned} \text{Área} &= \left| \int_{-1}^0 (-x^2 + 3x) dx \right| + \left| \int_0^3 (-x^2 + 3x) dx \right| = \left| \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_{-1}^0 \right| + \left| \left[ -\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^3 \right| = \\ &= |F(0) - F(-1)| + |F(3) - F(0)| = \left| 0 - \frac{11}{6} \right| + \left| \frac{9}{2} - 0 \right| = \frac{11}{6} + \frac{9}{2} = \frac{19}{3} \text{ u}^2 \end{aligned}$$

Por tanto, el área de la región es igual a  $\frac{19}{3} \text{ u}^2$

## Volumen de un sólido de revolución

Una curiosidad relacionada con este apartado hace referencia a *Johannes Kepler*. Su segunda esposa, *Susana*, narraba en una carta que en la celebración de la boda, *Kepler* observó que el volumen de los barriles de vino se estimaba con una varilla introducida diagonalmente en el tonel por el agujero de la tapa. *Kepler* empezó a pensar en el razonamiento matemático que justifica ese proceso, y de ese modo comenzó el estudio de los volúmenes de los sólidos de revolución.

Si  $f(x)$  es una función continua en el intervalo  $[a, b]$ , entonces el volumen del sólido generado al girar la función en torno al eje  $OX$ :



se calcula mediante la función:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

### Ejemplo:

- ✚ Halla el volumen del cono de altura 3 unidades definido al girar en torno al eje de abscisas la recta  $y = 3x$ .

Los datos del ejemplo nos hacen calcular la integral:

$$V = \pi \int_0^3 (3x)^2 dx = 9\pi \int_0^3 x^2 dx = 9\pi \cdot \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 9\pi \cdot \left( \frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = 81\pi \text{ u}^3$$


## Actividad resuelta

- ✚ Calcula el volumen de una esfera de radio  $R$ .

Como antes con el círculo, elegimos una circunferencia centrada en el origen, cuya ecuación es:

$$x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{R^2 - x^2}$$

Como antes, la simetría permite calcular el volumen a partir del recinto del primer cuadrante:



$$V = 2 \cdot \int_0^R (\sqrt{R^2 - x^2})^2 dx = 2 \cdot \int_0^R (R^2 - x^2) dx$$

Que es una primitiva inmediata y, aplicando la regla de Barrow obtenemos:

$$V = 2 \cdot \left[ R^2 \cdot x - \frac{x^3}{3} \right]_0^R = 2 \cdot \left[ \left( R^2 \cdot R - \frac{R^3}{3} \right) - \left( R^2 \cdot 0 - \frac{0^3}{3} \right) \right]$$

Con la que obtenemos la conocida fórmula:

$$V = \frac{4\pi}{3} \cdot R^3$$

CURIOSIDADES. REVISTA**Eudoxo de Cnido (390 aC – 337 aC)**


*Eudoxo* demostró que el volumen de una pirámide es la tercera parte del de un prisma de su misma base y altura; y que el volumen de un cono es la tercera parte del de un cilindro de su misma base y altura.

Para demostrarlo elaboró el llamado método de *exhausción*.

**Método de exhausción**

El **método de exhausción** es un procedimiento geométrico de aproximación a un resultado, con el cual el grado de precisión aumenta en la medida en que avanza el cálculo. El nombre proviene del latín *exhaustiō* (agotamiento, exhausto)

Se utiliza para aproximar el área de un círculo, o la longitud de una circunferencia, inscribiendo y circunscribiendo polígonos regulares con cada vez mayor número de lados.

**Arquímedes**

*Arquímedes*, escribió su tratado sobre “*El método de teoremas mecánicos*”, que se consideraba perdido hasta 1906. En esta obra, *Arquímedes* emplea el cálculo infinitesimal, y muestra cómo el método de fraccionar una figura en un número infinito de partes infinitamente pequeñas puede ser usado para calcular su área o volumen. Fue escrito en forma de una carta dirigida a *Eratóstenes de Alejandría*.

Observa cómo es la base de los conceptos que en el siglo XVII permitieron a *Isaac Newton* y a *Leibniz* unificar el cálculo diferencial con el cálculo integral, y cómo es el precursor del concepto de integral definida como las sumas inferiores y las sumas superiores de *Riemann*.






¿Has pensado alguna vez en la historia de los símbolos matemáticos?


Al principio las matemáticas eran *retóricas*, es decir, todos los cálculos se explicaban con palabras. Poco a poco empezaron a usarse *abreviaturas*, símbolos para representar las operaciones. Hoy las matemáticas están llenas de *símbolos*.

Por ejemplo, para indicar sumas y restas, primero se usaron letras como **p** y **m**, pero en el siglo XV comenzó a usarse los símbolos **+** y **-**. Para el producto se usó el aspa, **x**, de la cruz de San Andrés, pero **Leibniz** escribió a **Bernoulli** que ese símbolo no le gustaba pues se confundía con la  $x$ , y comenzó a usar el punto, **·**. Para el cociente, la barra horizontal de las fracciones es de origen árabe, y los dos puntos, de nuevo se los debemos a **Leibniz**, que los aconseja cuando se quiere escribir en una sola línea.



El símbolo de infinito,  $\infty$ , se debe a **John Wallis** y, a pesar de su parecido, no está relacionado con la cinta de Möebius, sino con la Lemniscata.

En 1706 se empezó a usar  $\pi$ , como inicial de la palabra griega "perímetro" y se popularizó con **Euler** en 1737.



El símbolo de la integral se lo debemos, de nuevo, a **Leibniz**, y es una estilización de la letra **S**, inicial de suma. También le debemos la notación  $dx$ ,  $dy$  para el cálculo diferencial.

A **Euler** le debemos la invención de muchos símbolos y la popularización de otros: No sabemos por qué uso la letra **e** para representar al número **e**, base de los logaritmos neperianos, la letra **i**, para la unidad imaginaria compleja,  $\Sigma$  para el sumatorio, y la notación  $f(x)$  para las funciones.



En lógica y teoría de conjuntos se usan muchos y nuevos símbolos, como  $\cap$ ,  $\cup$ ,  $\supset$ ,  $\not\subset$ ,  $\subset$ ,  $\in$ ,  $\notin$ ,  $\{$ ,  $\}$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\Rightarrow$ , ... que podemos deber a **George Boole**.



## RESUMEN

### CUADRO DE PRIMITIVAS

$\int dx = x + C$	$\int f'(x) dx = f(x) + C$
$\int (f(x) \pm g(x) \pm \dots) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \pm \dots$	$\int a \cdot f(x) dx = a \cdot \int f(x) dx$
$\int f^n(x) f'(x) dx = \frac{1}{n+1} [f(x)]^{n+1} + C, n \neq -1$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x)  + C$
$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$	$\int a^{f(x)} f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + C, a \neq 1, a > 0$
$\int \cos [f(x)] f'(x) dx = \text{sen} [f(x)] + C$	$\int \text{sen} [f(x)] f'(x) dx = -\text{cos} [f(x)] + C$
$\int \sec [f(x)] \cdot \text{tg} [f(x)] f'(x) dx = \sec [f(x)] + C$	$\int \sec^2 [f(x)] f'(x) dx = \text{tg} [f(x)] + C$
$\int \text{cosec}^2 [f(x)] f'(x) dx = -\text{cotg} [f(x)] + C$	$\int \frac{f'(x) dx}{1 + f(x)^2} = \begin{cases} \text{arc tg} [f(x)] + C \\ -\text{arc cotg} [f(x)] + C \end{cases}$
$\int \frac{f'(x) dx}{\sqrt{1 - f(x)^2}} = \begin{cases} \text{arc sen} [f(x)] + C \\ -\text{arc cos} [f(x)] + C \end{cases}$	$\int \frac{f'(x) dx}{f(x) \sqrt{f(x)^2 - 1}} = \begin{cases} \text{arcsec} [f(x)] + C \\ -\text{arc cosec} [f(x)] + C \end{cases}$
<b>Método de integración por cambio de variable</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><math>\int g[f(x)] \cdot f'(x) dx \rightarrow t = f(x) \Rightarrow dt = f'(x) dx</math>  <math>\int g(t) dt = G(t) + C \Rightarrow F(x) = G[f(x)] + C</math></li> <li><math>\int f(x) dx \rightarrow x = g(t) \Rightarrow dx = g'(t) dt</math>  <math>\int f[g(t)] g'(t) dt = G(t) + C \Rightarrow F(x) = G[g^{-1}(x)] + C</math></li> </ol>
<b>Método de integración por partes</b>	$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$
<b>Regla de Barrow</b>	$\int_a^b f(x) dx = (F(x))_a^b = F(b) - F(a)$
<b>Área entre una curva y el eje OX</b>	$A = \int_a^b  f(x)  dx$
<b>Área entre dos curvas</b>	$A = \int_a^b  f(x) - g(x)  dx$
<b>Volumen de revolución en torno al eje OX</b>	$V = \pi \cdot \int_a^b [f(x)]^2 dx$

**EJERCICIOS Y PROBLEMAS.**

1. - Sabiendo que  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$  y  $\int f^n(x) f'(x) dx = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + C$ , calcula:

- |   |   |   |                                   |                   |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1) $\int x^5 dx$  | 2) $\int \frac{4}{x^5} dx$                                | 3) $\int \frac{dx}{x^2}$  | 4) $\int 37 dx$                   | 5) $\int 6x^7 dx$ |
| 6) $\int 5x^{1/4} dx$   | 7) $\int 5\sqrt{x^3} dx$                                  | 8) $\int (3-2x-x^4) dx$   | 9) $\int (2x^5-5x+3) dx$          |                   |
| 10) $\int (2+3x^3)^2 dx$                                      | 11) $\int 2(x^2+2)^3 dx$                                  | 12) $\int (1-x^3)^2 dx$   | 13) $\int \frac{x^3-x+2}{x^3} dx$ |                   |
| 14) $\int \left(-4x^{2/3}+2x\right) dx$                       | 15) $\int \left(3a-\frac{1}{3e^2}+2x^a\right) dx$         | 16) $\int \left(-\frac{3}{x^3}+2-\frac{3}{\sqrt{x}}\right) dx$      |                                   |                   |
| 17) $\int \left(3x^5-\frac{4}{3x^2}+2\sqrt[5]{x^2}\right) dx$ | 18) $\int (1-x)\sqrt{x} dx$                               | 19) $\int \frac{x^3+5x^2-4}{x^2} dx$                                |                                   |                   |
| 20) $\int \left(5e^x+\frac{2x^3-3x^2+5}{4x^2}\right) dx$      | 21) $\int \frac{(1+x)^2}{\sqrt{x}} dx$                    | 22) $\int \left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}x+\frac{2}{\sqrt{x}}\right) dx$ |                                   |                   |
| 23) $\int \sqrt{x}(x^3+1) dx$                                 | 24) $\int \left(\sqrt{x^5}-\frac{2}{3\sqrt{x}}\right) dx$ | 25) $\int \sqrt{x}(3-5x) dx$  |                                   |                   |
| 26) $\int \frac{(x+1)(x-2)}{\sqrt{x}} dx$                     | 27) $\int (3x+4)^2 dx$                                    | 28) $\int (3x-7)^4 dx$  |                                   |                   |
| 29) $\int x(x^2-4)^3 dx$                                      | 30) $\int 3x(x^2+2)^3 dx$                                 | 31) $\int (x^3+2)^2 x^2 dx$   | 32) $\int (x^3+3)x^2 dx$          |                   |
| 33) $\int (x-2)^{3/2} dx$                                     | 34) $\int (a+x)^3 dx$                                     | 35) $\int [(x+2)^3-(x+2)^2] dx$                                     |                                   |                   |
| 36) $\int \sqrt{3x+12} dx$                                    | 37) $\int \frac{dx}{\sqrt{x+3}}$                          | 38) $\int \frac{dx}{(x-1)^3}$                                       | 39) $\int (x^2-x)^4(2x-1) dx$     |                   |
| 40) $\int \frac{1}{\sqrt{x}}(1+\sqrt{x})^2 dx$                | 41) $\int \frac{x^3}{(x^4-1)^2} dx$                       | 42) $\int \frac{x dx}{(x^2+4)^3}$                                   | 43) $\int x\sqrt{x^2-7} dx$       |                   |
| 44) $\int (x-1)(x^2-2x+3)^4 dx$                               | 45) $\int \frac{3x}{\sqrt{1+7x^2}} dx$                    | 46) $\int \frac{8x^2}{(x^3+2)^2} dx$                                |                                   |                   |
| 47) $\int \frac{3x dx}{\sqrt[3]{x^2+3}}$                      | 48) $\int x \cdot \sqrt[3]{1-x^2} dx$                     | 49) $\int \frac{x^2}{\sqrt[4]{x^3+5}} dx$                           | 50) $\int x^2(x^3-1)^{3/5} dx$    |                   |
| 51) $\int \sqrt{x^2-2x^4} dx$                                 | 52) $\int (e^x+1)^3 e^x dx$                               | 53) $\int \sin^3 x \cos x dx$                                       |                                   |                   |
| 54) $\int x \cos^4 x^2 \sin x^2 dx$                           | 55) $\int \frac{x \ln(x^2+3)}{x^2+3} dx$                  | 56) $\int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$                               |                                   |                   |
| 57) $\int \frac{e^x}{2e^x-3} dx$                              | 58) $\int \operatorname{tg}^5 x \cdot \sec^2 x dx$        | 59) $\int \frac{\sec^2 3x}{\operatorname{tg} 3x} dx$                | 60) $\int \frac{\ln x}{3x} dx$    |                   |

2. - Sabiendo que  $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$  y  $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$ , calcula:

- |  |   |   |   |                                 |                                |
|--|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 1) $\int \frac{dx}{x+2}$   | 2) $\int \frac{dx}{2x-3}$   | 3) $\int \frac{dx}{x-1}$                                | 4) $\int \frac{x dx}{x^2-1}$                        | 5) $\int \frac{x^2}{1-2x^3} dx$ | 6) $\int \frac{x^2}{1-x^3} dx$ |
| 7) $\int \frac{3x dx}{x^2+2}$  | 8) $\int \frac{4}{3x+5} dx$   | 9) $\int \frac{x+1}{x^2+2x+2} dx$                       | 10) $\int \left( \sqrt{x} + \frac{1}{x} \right) dx$ |                                 |                                |
| 11) $\int \left( \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x} + \sqrt{x} \right) dx$            | 12) $\int \frac{dx}{x \ln x}$   | 13) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})}$              |   |                                 |                                |
| 14) $\int \left( \frac{1}{2x-1} - \frac{1}{2x+1} \right) dx$                   | 15) $\int \frac{e^x}{e^x+1} dx$   | 16) $\int \frac{e^{2x}}{e^{2x}+3} dx$                   | 17) $\int \operatorname{tg} x dx$                   |                                 |                                |
| 18) $\int \operatorname{cotg} x dx$  | 19) $\int \frac{5}{x \ln x} dx$   | 20) $\int \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\cos x}$ |   |                                 |                                |
| 21) $\int \frac{2 \operatorname{sen} x \cos x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} dx$ | 22) $\int \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{\operatorname{sen} x + \cos x} dx$ | 23) $\int x \operatorname{cotg} x^2 dx$                 |   |                                 |                                |

3. - Si  $\int e^x dx = e^x + C$ ,  $\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$ ,  $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$  y  $\int a^{f(x)} f''(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + C$ , calcula:

- |   |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
| 1) $\int 3^x dx$                                  | 2) $\int a^{4x} dx$                                 | 3) $\int e^{-x} dx$  | 4) $\int 4e^{3x} dx$              |
| 5) $\int 3x^2 e^{x^3+2} dx$                       | 6) $\int 4e^{4-x} dx$                               | 7) $\int x^2 e^{x^3} dx$                                       | 8) $\int (e^x + 1)^2 dx$          |
| 9) $\int \left( e^x + \frac{1}{e^x} \right)^2 dx$ | 10) $\int (e^x + x^6)^2 dx$                         | 11) $\int e^{-x^2+2} x dx$                                     | 12) $\int \frac{e^{\ln x}}{x} dx$ |
| 13) $\int \frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{x^3} dx$       | 14) $\int x e^{\operatorname{sen} x^2} \cos x^2 dx$ | 15) $\int e^{3 \cos 2x} \cdot \operatorname{sen} 2x dx$        |                                   |
| 16) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{5\sqrt{x}} dx$      | 17) $\int e^{\cos x} \cdot \operatorname{sen} x dx$ | 18) $\int \left( \frac{\sqrt{1+e^2}}{2e} - e^{x+3} \right) dx$ |                                   |
| 19) $\int e^{\operatorname{tg} 2x} \sec^2 2x dx$  | 20) $\int \frac{2x}{3} \cdot 3^{3+5x^2} dx$         | 21) $\int \frac{x}{2} \cdot 2^{3-5x^2} dx$                     |                                   |

4. - Sabiendo que  $\int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + C$ ,  $\int f'(x) \cdot \operatorname{sen} f(x) dx = -\cos f(x) + C$ ,  $\int \cos x dx = \operatorname{sen} x + C$  y  $\int \cos f(x) f'(x) dx = \operatorname{sen} f(x) + C$  calcula:

- |                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| 1) $\int \operatorname{sen}(2x+8) dx$ | 2) $\int \operatorname{sen} \frac{x}{2} dx$                             | 3) $\int \cos 3x dx$                             |
| 4) $\int x \operatorname{sen} x^2 dx$ | 5) $\int \left( \frac{3 \operatorname{sen} x - 2 \cos x}{4} \right) dx$ | 6) $\int \operatorname{sen} 2x dx$               |
| 7) $\int e^x \cos e^x dx$             | 8) $\int x \cos(2x^2) \cdot \operatorname{sen}(2x^2) dx$                | 9) $\int \frac{\operatorname{sen}(\ln x)}{x} dx$ |

5. – Si  $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x) dx = \operatorname{tg} x + C$  y  $\int \frac{f'(x)}{\cos^2 f(x)} dx = \int [1 + \operatorname{tg}^2 f(x)] \cdot f'(x) dx = \operatorname{tg} f(x) + C$ , calcula:

1)  $\int x(1 + \operatorname{tg} x^2) dx$

2)  $\int (1 + \operatorname{tg} x)^2 dx$

3)  $\int \operatorname{tg}^2 3x dx$

6. – Halla el valor de las siguientes integrales, usando un cambio de variable:

1)  $\int (2 + 5x)^4 dx$

2)  $\int (3 + 4x)^6 dx$

3)  $\int 6x(3 + x^2)^5 dx$

4)  $\int \left[ \frac{3}{5 + 4x} + \frac{3}{(5 + 4x)^3} \right] dx$

5)  $\int (\sqrt{3 + 2x} + \sqrt[3]{3 + 2x}) dx$

6)  $\int \left( \frac{e^x - 4}{e^{2x}} \right) dx$

7)  $\int \operatorname{sen}^3 x \cdot \cos x \cdot dx$

8)  $\int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} dx$

9)  $\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^4 x} dx$

10)  $\int x\sqrt{x^2 + 4} dx$

11)  $\int \left( \frac{e^x + 3}{e^{2x}} \right) dx$

12)  $\int \left( \frac{e^{-x} + 2}{e^{3x}} \right) dx$

13)  $\int \frac{(x - 2\sqrt{x})^2}{3x^2} dx$

14)  $\int \frac{(2 + 3\sqrt{x})^2}{4x} dx$

15)  $\int \operatorname{sen} \sqrt{x} dx$

7. – Halla el valor de las siguientes integrales, usando el método de integración por partes:

1)  $\int 3x \cos x dx$

2)  $\int x^2 \cdot \operatorname{sen} x dx$

3)  $\int x^2 \ln x dx$

4)  $\int \sqrt{x} \ln x dx$

5)  $\int \frac{\ln x}{x^2} dx$

6)  $\int 2e^x \cdot \cos x \cdot dx$

7)  $\int 2e^x \cdot \operatorname{sen} x dx$

8)  $\int e^x \cdot \cos 3x dx$

9)  $\int \frac{4 - 2x^2}{x} \cdot \ln x dx$

8. – Halla el valor de las siguientes integrales racionales:

1)  $\int \frac{2}{x^2 + 1} dx$

2)  $\int \frac{3}{2x^2 + 2} dx$

3)  $\int \frac{3}{x - 3} dx$

4)  $\int \frac{2}{3x^2 + 3} dx$

5)  $\int \frac{5x}{x^2 + 3} dx$

6)  $\int \frac{3x - 2}{x^2 + 1} dx$

7)  $\int \frac{(2x - 3)^2}{3x^2} dx$

8)  $\int \frac{x + 2}{x + 1} dx$

9)  $\int \frac{x - 1}{x + 1} dx$

10)  $\int \frac{3x - 1}{x + 3} dx$

11)  $\int \frac{3x^3}{x^2 - 4} dx$

12)  $\int \frac{3x^3}{x^2 - 1} dx$

13)  $\int \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 2} dx$

14)  $\int \frac{x^3 + 4x^2 - 2x + 5}{x - 2} dx$

15)  $\int \frac{2}{x^2 - 4} dx$

16)  $\int \frac{3x + 2}{x^2 + 3x} dx$

17)  $\int \frac{4x + 3}{x^2 - 1} dx$

18)  $\int \frac{3x^2}{x^2 + 6x + 9} dx$

19)  $\int \frac{x + 2}{x^2 - 5x + 6} dx$

20)  $\int \frac{3x - 2}{x^2 - 4x + 4} dx$

21)  $\int \frac{3x + 1}{x^3 - 4x^2 + 3x} dx$

22)  $\int \frac{2x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2} dx$

23)  $\int \frac{x - 1}{x^2 - 4x + 4} dx$

24)  $\int \frac{3x - 1}{x^2 + 6x + 9} dx$

9. – Halla el valor de las siguientes integrales definidas:

1)  $\int_1^3 \frac{dx}{2x}$

2)  $\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx$

3)  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{3}} \sin x dx$

4)  $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin 3x dx$

5)  $\int_{-4}^4 |x| dx$

6)  $\int_{-1}^1 \left( 3x^2 - 2x + \frac{1}{2} \right) dx$

7)  $\int_{-1}^2 \left( \frac{2}{x+2} - \frac{3}{x-3} \right) dx$

8)  $\int_{-2}^2 \left( \frac{3a}{5} - \frac{x}{2} \right) dx$

9)  $\int_2^3 \frac{1}{x \cdot (\ln x)^3} dx$

10)  $\int_{-2}^0 \left( e^{2x} + \frac{3}{e^{3x}} \right) dx$

11)  $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{3}} (\sin x - \cos x)^2 dx$

10. – Halla el valor de  $b$  para que se cumpla  $\int_{-1}^b (2bx - 3x^2) dx = -12$ .

11. – Halla el área comprendida entre la función  $f(x) = x^2 - 4x$ , el eje de abscisas y las rectas  $x=1$  y  $x=6$ .

12. – Halla el área limitada por la función  $f(x) = 0,5 + \cos x$ , el eje de abscisas y las rectas  $x=0$  y  $x=\pi$ .

13. – Halla el área de la región limitada por la función  $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$  y el eje de abscisas.

14. – Calcula el área de la porción de plano que limitan las curvas  $y = \frac{1}{2}x^2 - x + 1$  e  $y - x - 1 = 0$ .

15. – Halla el área delimitada por las gráficas:

a)  $f(x) = \sqrt{x}$  y  $g(x) = x^2$

b)  $f(x) = x^2 + x + 4$  y  $g(x) = -x^2 + 2x + 5$

## AUTOEVALUACIÓN

- Los valores de  $a$ ,  $b$  y  $c$  para los que  $F(x) = ax^3 + be^x + c\text{sen}x$  es una primitiva de la función  $f(x) = 3x^2 - 7e^x + 5\cos x$  son:
  - 1, -7, 5;
  - 3, 7, -5;
  - 1, -7, -5;
  - 1, -7, 5
- La integral inmediata  $\int x\sqrt{2x^2 + 3} dx$  vale:
  - $\frac{\sqrt{(2x^2 + 5)^3}}{6} + C$ ;
  - $\frac{\sqrt{(2x^2 + 3)^3}}{6} + C$
  - $\frac{\sqrt{(2x^2 + 5)^3}}{4} + C$ ;
  - $\frac{\sqrt{(2x^2 + 5)^2}}{6} + C$
- La integral  $\int \frac{\text{sen}2x dx}{\text{sen}^4 x + \text{cos}^4 x}$  vale:
  - $\text{tg}(\arccos x) + C$ ;
  - $-2 \arcsen(\arctg x) + C$ ;
  - $\arctg(\arcsen x) + C$ ;
  - $-2\arctg(\cos 2x) + C$ .
- Al integrar por partes  $\int \frac{x \cdot e^{\arcsen x}}{\sqrt{1-x^2}} \cdot dx$  se obtiene:
  - $e^{\arcsen x} (\sqrt{1-x^2})$ ;
  - $\frac{1}{2} e^{\arcsen x} (x + \sqrt{1-x^2}) + C$
  - $e^{\arcsen x} (x - \sqrt{1-x^2}) + C$ ;
  - $\frac{1}{2} e^{\arcsen x} (x - \sqrt{1-x^2}) + C$
- La integral  $\int \frac{2x+2}{x^2+4x+13} dx$  vale:
  - $\ln(x^2 + 4x + 13) - \arctg \frac{x+2}{3} + C$ ;
  - $\ln(x^2 + 4x + 13) - \arctg \frac{2x+2}{3} + C$
  - $\ln(x^2 + 4x + 13) - \arctg \frac{x+2}{5} + C$ ;
  - Ninguna es correcta
- La integral  $\int \frac{dx}{\text{sen}^2 x \cdot \text{cos}^2 x}$  vale:
  - $\text{tg} x - \text{sen} x + C$ ;
  - $-\text{tg} x - \text{cotg} x + C$
  - $\text{tg} x + \text{cotg} x + C$ ;
  - $\text{tg} x - \text{cotg} x + C$
- La integral definida  $\int_0^\pi \cos x dx$  vale:
  - 1;
  - $\pi$
  - 0;
  - 1
- El área comprendida entre la gráfica de la función  $f(x) = -x^2 + 4x$ , el eje de abscisas y las rectas  $x = 0$  y  $x = 4$  vale:
  - 128/3;
  - 32/3
  - 64/2;
  - 64/3
- El área comprendida entre las gráficas de las funciones  $f(x) = -x^2 + 4x$  y  $g(x) = x$  vale:
  - 9/2;
  - 19/3
  - 27/2;
  - 3
- El volumen del sólido de revolución generado por  $y = x^2$ , entre 0 y 2, al girar en torno al eje de abscisas es:
  - $32\pi$ ;
  - $16\pi/5$
  - $16\pi$ ;
  - $32\pi/5$

Apéndice: Problemas de integrales en las P.A.U.

(1) Calcula una primitiva de la función  $f(x) = \frac{x^3 - 3x + 5}{\sqrt[3]{x}}$

(2) Calcula:

a)  $\int \frac{2x^3 - 3x^2 - 2x - 1}{x^2 - x - 2} dx$

b)  $\int \sqrt{x} \ln^2 x dx$

c)  $\int_1^2 \frac{dx}{x^2 + 3x}$

d)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(2x) + x \cdot \sin x) dx$

e)  $\int e^x \cos 3x dx$

f)  $\int \arctan(3x) dx$

(3) Calcula haciendo el cambio de variable  $e^x = t$ :

a)  $\int \frac{e^x}{e^{2x} - 1} dx$

b)  $\int \frac{e^x - 4e^{2x}}{1 + e^x} dx$

(4) Calcula  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^{2x} + x \cos x) dx$

(5) a) Encuentra todas las funciones  $f(x)$  cuya segunda derivada es  $f''(x) = xe^x$ .

b) De todas ellas, determina aquella cuya gráfica pasa por los puntos  $A(0,2)$  y  $B(2,0)$ .

(6) Considera la función  $y = x^3 - 3x^2 + 1$

a) Determina la recta tangente en el punto en que la función alcanza su máximo relativo.

b) Dibuja el recinto limitado por la curva y la recta tangente anterior.

c) Halla el área del recinto del apartado (b).

(7) Obtén el área del recinto cerrado por las curvas  $y = 1 + \cos x$  e  $y = 0$  en el intervalo  $[-\pi, +\pi]$ .

(8) Considera la función  $f(x) = \frac{1}{2} - \sin x$

a) Dibuja el recinto acotado por la gráfica de  $f(x)$ , el eje  $OX$  y las rectas  $x = 0$  y  $x = \frac{\pi}{2}$ .

b) Calcula el área del recinto anterior.

(9) a) Dibuja el recinto plano limitado por la parábola  $y = 4x - x^2$  y las tangentes a la curva en los puntos de intersección con el eje de abscisas.

b) Halla el área del recinto dibujado en (a).

(10) Halla el área de la zona del plano limitada por las rectas  $y = 0$ ,  $x = 1$  y  $x = e$ , y la gráfica de la curva  $y = \ln^2(x)$ .

(11) Las gráficas de las funciones  $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$  y  $g(x) = x^2$  limitan un recinto finito en el plano.

a) Dibuja un esquema del recinto.

b) Calcula su área.



(12) Sea  $f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x \leq 1 \\ \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ , donde  $\ln x$  significa logaritmo neperiano de  $x$ .

a) Dibuja el recinto acotado comprendido entre la gráfica de  $f(x)$  y la recta  $y = 1$ .

b) Calcula el área del recinto anterior.

(13) Sea la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \begin{cases} 4x+12 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 - 4x + 3 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

a) Haz un dibujo aproximado de la gráfica de la función  $f$ .

b) Calcula el área del recinto limitado por la función  $f$ , el eje de abscisas y la recta  $x = 2$ .

(14) Sea la parábola  $y = x^2 - 3x + 6$

a) Halla la ecuación de la tangente a la gráfica de esa curva en el punto de abscisa  $x = 3$ .

b) Haz un dibujo aproximado del recinto limitado por la gráfica de la parábola, el eje  $OY$  y la recta tangente hallada anteriormente.

c) Calcula el área del recinto anterior.

(15) Dada la función  $f(x) = (x-a)\cos x$ , busca el valor del número real  $a$  sabiendo que

$$\int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{\pi}{2} - 2$$

(16) Considera las curvas  $f(x) = x^2 - 3x - 2$  y  $g(x) = x^2 - x - 2$ .

a) Encuentra sus puntos de intersección.

b) Representa el recinto limitado que encierran entre ellas.

c) Encuentra el área del recinto limitado por las dos curvas.

(17) Las curvas  $y = e^x$ ,  $y = e^{-x}$  y la recta  $x = 1$  limitan un recinto finito en el plano.

a) Dibuja un esquema del recinto.

b) Calcula su área.

(18) Se considera la curva de ecuación  $y = x^3 - 2x^2 + x$

a) Calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa curva en el origen.

b) Dibuja un esquema del recinto limitado por la gráfica de la curva y la recta hallada.

c) Calcula el área de ese recinto.

(19) La derivada de una función  $f(x)$  es  $f'(x) = (x+2) \cdot (x^2 - 9)$

a) Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos de  $f(x)$ .

b) Determina la función  $f$  sabiendo que  $f(0) = \frac{1}{5}$ .

- (20) La gráfica de la parábola  $y = 2x^2$  divide al cuadrado de vértices  $A(0,0)$ ,  $B(2,0)$ ,  $C(2,2)$  y  $D(0,2)$  en dos recintos planos.
- Dibuja la gráfica de la función y los recintos.
  - Calcula el área de cada uno de ellos.
- (21) a) Calcula la función  $f(x)$  sabiendo que su derivada es  $f'(x) = (x-1)e^x$  y que  $f(2) = e$ .
- Demuestra que  $f(x)$  tiene un extremo relativo en un punto del eje de abscisas y razona si es máximo o mínimo.
- (22) Las gráficas de la curva  $y = x^3$  y de la parábola  $y = x^2 + 2x$  encierran un recinto plano.
- Dibuja ese recinto.
  - Calcula su área.
- (23) Sea  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  la función definida por  $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ mx + n & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$
- Calcula  $m$  y  $n$  para que  $f$  sea continua en todo su dominio.
  - Para esos valores hallados, calcula el área del recinto limitado por la gráfica de  $f$  y la recta  $y = 1$ .
- (24) Sea la función  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \begin{cases} 2x + 4 & \text{si } x \leq 0 \\ (x-2)^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$
- Dibuja la gráfica de la función.
  - Halla el área del recinto limitado por la gráfica de  $f$  y el eje de abscisas.
- (25) La curva  $y = x^3 - 3x$  y la recta  $y = x$  limitan un recinto finito en el plano.
- Dibuja un esquema del recinto.
  - Calcula su área.
- (26) La parábola  $x = y^2 + 1$  y la recta  $x = 3$  limitan un recinto finito en el plano.
- Dibuja un esquema del recinto.
  - Calcula su área.
- (27) La curva  $y = x^2 + 3$  y la recta  $y = 2x + 3$  limitan un recinto finito en el plano.
- Dibuja un esquema del recinto.
  - Calcula su área.
- (28) Se considera la parábola  $y = 6x - x^2$
- Calcula la ecuación de las rectas tangentes a la gráfica de la parábola en los puntos de corte con el eje  $OX$ .
  - Dibuja un esquema del recinto limitado por la gráfica de la parábola y las rectas halladas anteriormente.
  - Calcula el área de ese recinto.
- (29) Se considera la función  $f(x) = \begin{cases} 2x - 2 & \text{si } x < 2 \\ e^{x-2} + k^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$
- Determina el valor de  $k > 0$  para que la función sea continua en el intervalo  $[0,4]$ .
  - Suponiendo que  $k = 1$ , halla la recta tangente en  $x = 3$ .
  - Suponiendo que  $k = 1$ , halla el área que la función determina con el eje  $OX$ , para  $x \in [0,4]$ .
- (30) a) Resuelve por partes la siguiente integral:  $\int x(1 - \ln x) dx$
- De todas las primitivas de  $f(x) = x(1 - \ln x)$  calcula la que pasa por el punto  $(1,3)$ .

- (31) La gráfica de la parábola  $y^2 = 8x$  y la recta  $x = 2$  encierran un recinto plano.  
 a) Dibuja aproximadamente dicho recinto.  
 b) Calcula el área de ese recinto.
- (32) La gráfica de la curva  $f(x) = \frac{4}{2-x}$  y las rectas  $y = 4$  y  $x = 0$  encierran un recinto plano.  
 a) Dibuja aproximadamente dicho recinto.  
 b) Calcula el área de ese recinto.
- (33) Esboza la gráfica de la parábola  $y = -x^2 + x + \frac{7}{4}$  y halla el área de la región del plano determinada por la parábola y la recta que pasa por los puntos  $(0, \frac{1}{4})$  y  $(\frac{1}{6}, 0)$ .
- (34) Se dispone de una chapa de acero que puede representarse por la región del plano determinada por la parábola  $y = -x^2 + 4$  y la recta  $y = 1$ .  
 a) Representa gráficamente la chapa y calcula su área.  
 b) Determina las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede obtener a partir de dicha chapa con la condición de que uno de sus lados esté en la recta  $y = 1$ .
- (35) Representa gráficamente las parábolas  $y^2 - 4x = 0$  y  $x^2 - 4y = 0$  y calcula el área que encierran.
- (36) Se considera la función  $f(x) = 2 - \frac{x}{x^2 + 1}$   
 a) Halla los máximos, mínimos y puntos de inflexión.  
 b) Para  $x \in [0, 5]$ , esboza la gráfica de la función y calcula el área comprendida entre ella y el eje X.
- (37) Se considera la función  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$   
 a) Halla sus asíntotas, máximos y mínimos.  
 b) Representa gráficamente la función.  
 c) Halla el área delimitada por la función y el eje OX, para  $-1 \leq x \leq 1$ .
- (38) a) Calcula:  $\int x^3 \ln(x) dx$  donde  $\ln(x)$  es el logaritmo neperiano de  $x$ .  
 b) Utiliza el cambio de variable  $x = e^t - e^{-t}$  para calcular  $\int \frac{1}{\sqrt{4+x^2}} dx$ .

Indicación: Para deshacer el cambio de variable, utiliza:  $t = \ln\left(\frac{x + \sqrt{x^2 + 4}}{2}\right)$ .

- (39) a) Si  $f$  es una función continua, obtén  $F'(x)$  siendo:

$$F(x) = \int_0^x (f(t) + t^2 + t^3) dt$$

- b) Si  $f(1) = 1$  y además  $\int_0^1 f(t) dt = 1$ , halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de  $F(x)$  en el punto  $(1, F(1))$ .

- (40) a) Sea la función  $f(t) = \frac{1}{1+e^t}$ . Calcula  $\int f(t) dt$ . b) Se define  $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ . Calcula  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x}$

- (41) a) Halla el área del recinto limitado por la gráfica de  $f(x) = -\sin x$  y el eje OX entre las abscisas  $x = 0$  y  $x = 2\pi$ . b) Halla el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar la gráfica de  $f(x) = -\sin x$  alrededor del eje OX entre las abscisas  $x = 0$  y  $x = 2\pi$ .

## Ampliación

A lo largo del tema hemos desarrollado varios métodos, estrategias y aplicaciones de las integrales, pero hay mucho más. Dejamos este apartado para mostrar otras que superan los contenidos del temario.

### Integral de una función racional cuando el denominador tiene raíces complejas múltiples

Si al resolver la primitiva de una función racional:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx \quad \text{con } \text{Grado de } Q(x) > \text{Grado de } P(x)$$

$Q(x)$  tiene raíces complejas múltiples, es decir, en su factorización aparecen términos de la forma:

$$Q(x) = (ax^2 + bx + c)^k \cdot (x - d) \cdot \dots \cdot (x - e)^n \cdot \dots$$

Descomponemos la fracción algebraica como:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \left[ \frac{A(x)}{B(x)} \right]^l + \frac{C(x)}{D(x)} \Rightarrow \int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{A(x)}{B(x)} + \int \frac{C(x)}{D(x)} dx$$

con:

- $B(x)$  el máximo común divisor de  $Q(x)$  y  $Q'(x)$ ;
- $A(x)$  un polinomio, de grado uno menor que  $B(x)$ , a determinar;
- $D(x)$  el polinomio que resulta del cociente  $\frac{Q(x)}{B(x)}$ ;
- $C(x)$  un polinomio, de grado uno menor que  $D(x)$ , a determinar.

El desarrollo requiere bastante habilidad con las expresiones algebraicas, y acaba proporcionando una integral racional cuyo denominador tiene raíces complejas simples.

### Volumen de un sólido de revolución generado al girar en torno al eje $OY$

Si  $f(x)$  es una función continua en el intervalo  $[a, b]$ , entonces el volumen del sólido generado al girar la función en torno al eje  $OY$  se calcula con la integral:

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

### Longitud de un arco de curva

Si  $f(x)$  es una función continua en el intervalo  $[a, b]$ , entonces la longitud del arco de la curva entre los puntos de abscisa  $a$  y  $b$  se calcula como:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

### Superficie de un sólido de revolución generado al girar en torno al eje $OX$


Si  $f(x)$  es una función continua en el intervalo  $[a, b]$ , entonces la superficie del sólido generado al girar la función en torno al eje  $OX$  se calcula mediante la integral:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

## Ejemplos:

- ✚ Halla el volumen de la “plaza de toros” generada al girar la recta  $y = x$  alrededor del eje  $OY$  en el intervalo  $[1, 2]$ .

La figura cuyo volumen queremos hallar es:




Y se trata de calcular la integral:

$$V = 2\pi \int_1^2 x \cdot x \cdot dx = 2\pi \int_1^2 x^2 dx = 2\pi \cdot \left[ \frac{x^3}{3} \right]_1^2 = 2\pi \cdot \left( \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} \right) = \frac{14\pi}{3} u^3$$

- ✚ Halla la longitud de una circunferencia de radio  $r$ .

Debemos utilizar la expresión:  $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ , así que derivamos la ecuación de la circunferencia:

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{r^2 - x^2} \Rightarrow y' = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$



Entonces, utilizando la simetría de la circunferencia otra vez:

$$\begin{aligned} L &= 4 \cdot \int_0^r \sqrt{1 + \left[ \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \right]^2} dx = 4 \cdot \int_0^r \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx \\ &= 4 \cdot \int_0^r \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx = 4r \cdot \int_0^r \frac{dx}{\sqrt{r^2 - x^2}} \end{aligned}$$

La primitiva se resuelve con el cambio:

$$x = r \cdot \operatorname{sen} t \Rightarrow dx = r \cdot \cos t \cdot dt$$

como vimos en el apartado 3.5, y proporciona:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{r^2 - x^2}} = \int \frac{r \cdot \cos t \cdot dt}{\sqrt{r^2 - r^2 \operatorname{sen}^2 t}} = \int dt = \operatorname{arcsen} t + C = \operatorname{arcsen} \frac{x}{r} + C$$

Aplicando la regla de Barrow obtenemos:

$$L = 4 \cdot \left[ \operatorname{arcsen} \frac{x}{r} \right]_0^r = 4 \cdot \left( \operatorname{arcsen} \frac{r}{r} - \operatorname{arcsen} \frac{0}{r} \right) = 4 \cdot \left( \frac{\pi}{2} - 0 \right)$$

Es decir:

$$L = 2\pi r \text{ u}$$