


TEMA 4 – FUNCIONES ELEMENTALES


FUNCIÓN

EJERCICIO 1 : Indica cuáles de las siguientes representaciones corresponden a la gráfica de una función. Razona tu respuesta:



Solución: En una función, a cada valor de x le corresponde, a lo sumo, un valor de y . Por tanto, a) es función, pero b) no lo es.

EJERCICIO 2 : La siguiente gráfica corresponde a la función $y = f(x)$:



a) ¿Cuál es su dominio de definición?

b) Indica los tramos en los que la función es creciente y en los que es decreciente.

c) ¿En qué punto tiene la función su máximo?


Solución:

a) $[0, 14]$

b) Es creciente en $[0, 6]$ y decreciente en $[6, 14]$.

c) El máximo está en el punto $(6, 3)$.

EJERCICIO 3 : Dadas las funciones:



a) Di si son continuas o no.


b) Halla la imagen de $x = 1$ para cada una de las cuatro funciones.

Solución:

a) Solo es continua la II).

b) I) $x = 1 \rightarrow y = 2$ II) $x = 1 \rightarrow y = 2$ III) $x = 1 \rightarrow y$ no está definida. IV) $x = 1 \rightarrow y = 1$

EJERCICIO 4 : Dada la gráfica:



a) Di si $f(x)$ es continua o no. Razona tu respuesta.

b) Halla $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$ y $f(3)$.

Solución:

a) No es continua, puesto que en $x = 2$ no está definida.

b) $f(-1) = -1$; $f(0) = 0$; $f(2)$ no existe; $f(3) = 2$

EJERCICIO 5 : Halla $f(-1)$, $f(0)$ y $f(2)$, siendo: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x+1 & \text{si } -1 < x \leq 2 \\ x^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

Solución:


$$f(-1) = 3 \cdot (-1)^2 - 1 = 3 \cdot 1 - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$f(0) = 0 + 1 = 1$$

$$f(2) = 2 + 1 = 3$$

DOMINIO

EJERCICIO 6 : A partir de la gráfica de estas funciones, indica cuál es su dominio y su recorrido:



Solución:

- | | | |
|---|--|--|
| a) Dominio = $\mathbf{R} - \{-1\}$
Recorrido = $\mathbf{R} - \{-2\}$ | b) Dominio = $[0, +\infty)$
Recorrido = $[0, \infty)$ | c) Dominio = \mathbf{R}
Recorrido = $(0, \infty)$ |
| d) Dominio = $(0, \infty)$
Recorrido = \mathbf{R} | e) Dominio = $\mathbf{R} - \{-2\}$
Recorrido = $\mathbf{R} - \{1\}$ | f) Dominio = $(-\infty, 3]$
Recorrido = $[0, \infty)$ |

EJERCICIO 7 : Halla el dominio de definición de las siguientes funciones:

- | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| a) $y = \frac{1}{x^2 - 16}$ | b) $y = \sqrt{1 + 2x}$ | c) $y = \frac{x}{x^2 - 4}$ | d) $y = \sqrt{2x}$ | e) $y = \frac{1}{x^2 + 4}$ |
| f) $y = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$ | g) $y = \frac{1}{x^2 - 2x}$ | h) $y = \sqrt{6+3x}$ | i) $y = \frac{3}{(x-5)^2}$ | j) $y = \sqrt{2x-4}$ |
| k) $y = \frac{1}{x^2 - 9}$ | l) $y = \sqrt{x-2}$ | m) $y = \frac{2+x}{x^2}$ | n) $y = \sqrt{3x-1}$ | ñ) $y = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$ |
| o) $y = \frac{1}{3x-x^2}$ | p) $y = \sqrt{x^2-1}$ | q) $y = \frac{2x}{(x-3)^2}$ | | |

Solución:

- a) $x^2 - 16 = 0 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm\sqrt{16} = \pm 4 \rightarrow \text{Dominio} = \mathbf{R} - \{-4, 4\}$
- b) $1 + 2x \geq 0 \Rightarrow 2x \geq -1 \Rightarrow x \geq \frac{-1}{2} \rightarrow \text{Dominio} = \left[\frac{-1}{2}, +\infty\right)$
- c) $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{4} \Rightarrow x = \pm 2 \rightarrow \text{Dominio} = \mathbf{R} - \{-2, 2\}$
- d) $2x \geq 0 \Rightarrow x \geq 0 \rightarrow \text{Dominio} = [0, +\infty)$
- e) $x^2 + 4 \neq 0$ para todo $x \in \mathbf{R} \rightarrow \text{Dominio} = \mathbf{R}$

f) $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2 \rightarrow \text{Dominio} = (2, +\infty)$

g) $x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x - 2) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \text{Dominio} = \mathbf{R} - \{0, 2\}$

h) $6 + 3x \geq 0 \Rightarrow 3x \geq -6 \Rightarrow x \geq -2 \rightarrow \text{Dominio} = [-2, +\infty)$

i) $(x - 5)^2 = 0 \Rightarrow x = 5 \rightarrow \text{Dominio} = \mathbf{R} - \{5\}$

j) $2x - 4 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 4 \Rightarrow x \geq 2 \rightarrow \text{Dominio} [2, +\infty)$

k) $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt{9} = \pm 3 \rightarrow \text{Dominio} = \mathbf{R} - \{-3, 3\}$

l) $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \rightarrow \text{Dominio} = [2, +\infty)$

m) $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \rightarrow \text{Dominio} = \mathbf{R} - \{0\}$

n) $3x - 1 \geq 0 \Rightarrow 3x \geq 1 \Rightarrow x \geq \frac{1}{3} \rightarrow \text{Dominio} = \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$


ñ) $x > 0 \rightarrow \text{Dominio} = (0, +\infty)$

o) $3x - x^2 = 0 \Rightarrow x(3 - x) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases} \rightarrow \text{Dominio} = \mathbf{R} - \{0, 3\}$

p) $x^2 - 1 \geq 0 \rightarrow \text{Dominio} = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

q) $(x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3 \rightarrow \text{Dominio} = \mathbf{R} - \{3\}$


EJERCICIO 8 : Tenemos una hoja de papel de base 18,84 cm y altura 30 cm. Si recortamos por una línea paralela a la base, a diferentes alturas, y enrollamos el papel, podemos formar cilindros de radio 3 cm y altura x :



El volumen del cilindro será: $V = \pi \cdot 3^2 \cdot x = 28,26 x$
 ¿Cuál es el dominio de definición de esta función?

Solución: x puede tomar valores entre 0 y 30 cm. Por tanto, Dominio = $(0, 30)$.

EJERCICIO 9 : De un cuadrado de lado 10 cm se recorta una tira de x cm en la base y otra de la misma longitud en la altura, obteniéndose un nuevo cuadrado de lado $(10 - x)$:




El área de este nuevo cuadrado será:
 $A = (10 - x)^2$

¿Cuál es el dominio de definición de esta función?

Solución: x puede tener valores entre 0 y 10 cm. Por tanto, Dominio = $(0, 10)$.

EJERCICIO 10 : Vamos a considerar todos los rectángulos de 30 cm de perímetro. Si llamamos x a la longitud de la base, el área será:



$A = x(15 - x)$ ¿Cuál es el dominio de definición de esta función?


Solución: x puede tomar valores entre 0 y 15 cm. Por tanto, Dominio = $(0, 15)$.

FUNCIONES LINEALES

EJERCICIO 11 : Representa gráficamente:

a) $y = \frac{3}{2}x - 2$ b) $y = -0,5x + 3,5$ c) $y = \frac{-3}{5}x + 1$ d) $f(x) = \frac{4 - 2x}{5}$

Solución:




EJERCICIO 12 : Escribe la ecuación de la recta que pasa por los puntos (3, -4) y (-2, 3).

Solución: La pendiente de la recta es: $m = \frac{3 - (-4)}{-2 - 3} = \frac{7}{-5} = -\frac{7}{5}$

La ecuación será: $y + 4 = \frac{-7}{5}(x - 3) \Rightarrow y = \frac{-7}{5}x + \frac{1}{5}$

EJERCICIO 13 : Escribe la ecuación de las rectas cuyas gráficas son las siguientes:



Solución:

a) Vemos que la recta pasa por los puntos (1, 1) y (4, 3). Su pendiente será: $m = \frac{3 - 1}{4 - 1} = \frac{2}{3}$

La ecuación será: $y - 1 = \frac{2}{3}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$

b) Observamos que la recta pasa por los puntos (0, 20) y (50, 80). Su pendiente será: $m = \frac{80 - 20}{50 - 0} = \frac{60}{50} = \frac{6}{5}$

Por tanto, su ecuación es: $y = \frac{6}{5}x + 20$

EJERCICIO 14 : Halla la ecuación de la recta que pasa por (-1, 2) y cuya pendiente es $-\frac{1}{3}$.

Solución:

Escribimos la ecuación punto-pendiente: $y - 2 = -\frac{1}{3}(x + 1) \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$

FUNCIONES CUADRÁTICAS

EJERCICIO 15 : Representa gráficamente las funciones:

a) $y = -x^2 + 4x - 1$ b) $y = (x + 1)^2 - 3$ c) $y = -x^2 + 4$ d) $f(x) = -2x^2 + 4x$

Solución:

a) • Hallamos el vértice: $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{-2} = 2 \rightarrow y = 3 \rightarrow$ Punto (2, 3).

• Puntos de corte con los ejes:


Con el eje X $\rightarrow y=0 \rightarrow -x^2+4x-1=0 \rightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{16-4}}{-2} =$
 $= \frac{-4 \pm \sqrt{12}}{-2} \left[\begin{array}{l} x=0,27 \rightarrow \text{Punto}(0,27; 0) \\ x=3,73 \rightarrow \text{Punto}(3,73; 0) \end{array} \right.$

Con el eje Y $\rightarrow x=0 \rightarrow y=-1 \rightarrow \text{Punto}(0,-1)$

- Tabla de valores alrededor del vértice:

X	0	1	2	3	4
Y	-1	2	3	2	-1

- La gráfica es:



b) • Hallamos el vértice: $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-2}{2} = -1 \rightarrow y = -3 \rightarrow \text{Punto}(-1, -3)$.

- Puntos de corte con los ejes:

Con el eje X $\rightarrow y=0 \rightarrow x^2+2x+1-3=0 \Rightarrow x^2+2x-2=0$


$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4+8}}{2} \left[\begin{array}{l} x=0,73 \rightarrow \text{Punto}(0,73; 0) \\ x=-2,73 \rightarrow \text{Punto}(-2,73; 0) \end{array} \right.$

Con el eje Y $\rightarrow x=0 \rightarrow y=-2 \rightarrow \text{Punto}(0, -2)$

- Hallamos algún otro punto:

X	-3	-2	-1	0	1
Y	1	-2	-3	-2	1

- La gráfica es:



c) Hallamos el vértice: $V x = \frac{-b}{2a} = \frac{0}{2} = -0 \rightarrow y = 4 \rightarrow \text{Punto}(0,4)$.

- Puntos de corte con los ejes:


Con el eje X $\rightarrow y=0 \rightarrow -x^2+4=0 \Rightarrow x^2=4 \rightarrow$
 $\rightarrow x = \pm\sqrt{4} = \pm 2 \rightarrow \text{Puntos}(-2, 0) \text{ y } (2, 0)$

Con el eje Y $\rightarrow x=0 \rightarrow y=4 \rightarrow \text{Punto}(0,4)$

- Hallamos algún otro punto:

X	-2	-1	0	1	2
Y	0	3	4	3	0

- La gráfica es:



d) • El vértice de la parábola es: $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{-4} = 1 \rightarrow y = 2 \rightarrow \text{Punto}(1, 2)$

- Puntos de corte con los ejes:

Con el eje X $\rightarrow y=0 \rightarrow -2x^2+4x=0 \rightarrow x(-2x+4)=0$


$\left[\begin{array}{l} x=0 \rightarrow \text{Punto}(0, 0) \\ -2x+4=0 \rightarrow x=2 \rightarrow \text{Punto}(2, 0) \end{array} \right.$

Con el eje Y $\rightarrow x=0 \rightarrow y=0 \rightarrow \text{Punto}(0,0)$

- Hallamos algún otro punto:

X	-1	0	1	2	3
Y	-6	0	2	0	-6

- La gráfica es:



RECOPIACIÓN RECTAS Y PARÁBOLAS

EJERCICIO 16 :

a) Representa gráficamente: $y = -\frac{1}{2}x + 3$

b) Halla el vértice de la parábola: $y = 2x^2 - 10x + 8$


Solución:

a)

Hallamos dos puntos de la recta:

x	y
0	3
2	2

La gráfica será:



b) La abscisa del vértice es: $x = \frac{-b}{2a} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$

La ordenada es: $y = 2\left(\frac{5}{2}\right)^2 - 10\left(\frac{5}{2}\right) + 8 = \frac{-9}{2}$

El vértice es el punto $\left(\frac{5}{2}, \frac{-9}{2}\right)$.

EJERCICIO 17 :

a) Obtén la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-2, -1)$ y $(1, 3)$, y represéntala.

b) Halla los puntos de corte con los ejes de la parábola $y = -x^2 + 4x$.


Solución:

a)

La pendiente de la recta es: $m = \frac{3 - (-1)}{1 - (-2)} = \frac{3+1}{1+2} = \frac{4}{3}$

La ecuación será: $y - 3 = \frac{4}{3}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{4}{3}x + \frac{5}{3}$

Con los dos puntos que tenemos la podemos representar:



b) Puntos de corte con los ejes:

• Con el eje X: $y = 0 \rightarrow 0 = -x^2 + 4x \rightarrow x(-x + 4) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{Punto } (0, 0) \\ \text{Punto } (4, 0) \end{cases}$

• Con el eje Y: $x = 0 \rightarrow y = 0 \rightarrow \text{Punto } (0, 0)$

Los puntos de corte con los ejes son el $(0, 0)$ y el $(4, 0)$

EJERCICIO 18 :

a) Di cuál es la pendiente de cada una de estas rectas: I) $2x + y = 0$

II) $x - 2y + 1 = 0$

III) $y = 2$

b) Representa gráficamente: $y = x^2 - 3x$

Solución:

a) I) $y = -2x \rightarrow \text{pendiente} = -2$

II) $y = \frac{x+1}{2} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \rightarrow \text{pendiente} = \frac{1}{2}$

III) pendiente = 0

b)

Hallamos el vértice: $x = \frac{3}{2} \rightarrow y = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} = \frac{-9}{4} \rightarrow \left(\frac{3}{2}, \frac{-9}{4}\right)$

La gráfica sería:

Puntos de corte con los ejes:

- Con el eje Y $\rightarrow x=0 \rightarrow y=0 \rightarrow$ Punto (0,0)
- Con el eje X $\rightarrow y=0 \rightarrow x^2 - 3x = 0 \rightarrow x(x-3)=0$

$$\begin{cases} x=0 & \rightarrow \text{Punto (0,0)} \\ x=3 & \rightarrow \text{Punto (3,0)} \end{cases}$$




Tabla de valores alrededor del vértice:

X	0	1	3/2	2	3
Y	0	-2	-9/4	-2	0

EJERCICIO 19 :

- a) Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto (-1, 3) y tiene pendiente -1.
 b) Representa gráficamente: $y = -x^2 + 4$

Solución:

a) La ecuación será: $y - 3 = -1(x + 1) \Rightarrow y = -x + 2$

b)

El vértice es el punto (0, 4).

Los puntos de corte con los ejes son:


- Con el eje Y $\rightarrow x=0 \rightarrow y=4 \rightarrow$ Punto (0, 4)
- Con el eje X $\rightarrow y=0 \rightarrow -x^2 + 4=0 \rightarrow x^2=4$

$$\begin{cases} x=-2 & \rightarrow \text{Punto (-2,0)} \\ x=2 & \rightarrow \text{Punto (2,0)} \end{cases}$$

Tabla de valores alrededor del vértice:

X	-2	-1	0	0	1
Y	0	3	4	3	0

La gráfica sería:



EJERCICIO 20 ;


- a) Representa gráficamente: $2x + y - 1 = 0$
 b) Halla el vértice de la parábola: $y = 2x^2 - 8x + 2$

Solución:

a) Despejamos y: $y = -2x + 1$

Hallamos dos puntos de la recta y la representamos.

x	y
0	1
1	-1



b) La abscisa del vértice es: $x = \frac{-b}{2a} = \frac{8}{4} = 2$

La ordenada es: $y = 2 \cdot 4 - 8 \cdot 2 + 2 = 8 - 16 + 2 = -6$

El vértice es el punto (2, -6).

FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDAD INVERSA

EJERCICIO 21 : Representa gráficamente las siguientes funciones:

- a) $y = \frac{-3}{x+4}$ b) $y = \frac{-1}{x-3} - 2$ c) $y = -1 + \frac{2}{x-5}$


Solución:

a) Dominio de definición: $\mathbb{R} - \{-4\}$

Tabla de valores

X	$-\infty$	-7	-5	-4 ⁻	-4 ⁺	-3	-1	$+\infty$
Y	0	1	3	$+\infty$	$-\infty$	-3	-1	0


Las asíntotas son la recta $y=0$ y la recta $x=-4$.



b) Dominio de definición: $\mathbb{R} - \{3\}$

X	$-\infty$	1	2	3^-	3^+	4	5	$+\infty$
Y	-2	-1,5	-1	$+\infty$	$-\infty$	-3	-2,5	-2


Las asíntotas son las rectas $x = 3$ e $y = -2$.



c) Dominio de definición: $\mathbb{R} - \{5\}$

X	$-\infty$	3	4	5^-	5^+	6	7	$+\infty$
Y	-1	-2	-3	$-\infty$	$+\infty$	1	0	-1

. Las asíntotas son las rectas $x = 5$, $y = -1$.



FUNCION RADICAL

EJERCICIO 22 : Representa gráficamente las siguientes funciones:


a) $y = 1 - \sqrt{-3x}$ b) $y = \sqrt{3x-1}$ c) $y = \sqrt{2x+3} - 1$

Solución:

a) Dominio de definición: $(-\infty, 0]$

Hacemos una tabla de valores:


X	$-\infty$	-3	-2	-1	0
Y	$-\infty$	-2	-1,45	-0,73	-1



b) Dominio de definición: $[\frac{1}{3}, +\infty)$

Hacemos una tabla de valores:


X	1/3	1	2	3	$+\infty$
Y	0	1,41	2,24	2,83	$+\infty$



c) Dominio de definición: $[-\frac{3}{2}, +\infty)$

Tabla de valores:

X	-3/2	-1	1/2	3	$+\infty$
Y	-1	0	1	2	$+\infty$



FUNCIONES A TROZOS

EJERCICIO 23 : Representa gráficamente:

a) $y = \begin{cases} 2x^2 & \text{si } x < -1 \\ 2x + 4 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$ b) $y = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$ c) $y = \begin{cases} (-x + 1)/2 & \text{si } x \leq -1 \\ -x^2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$


Solución:

a)
Si $x < -1$, tenemos un trozo de parábola. ($V_x = 0$)
Si $x \geq -1$, tenemos un trozo de recta.


La gráfica es:

Tabla de valores:

X	$-\infty$	-3	-2	-1	-1	0	$+\infty$
Y	$+\infty$	18	8	2	2	4	$+\infty$



La gráfica es:



b)

Si $x \leq 2$, es un trozo de parábola. ($V_x = 0$)

Si $x > 2$, es un trozo de recta horizontal.

Tabla de valores:

X	$-\infty$	-2	-1	0	1	2	2	3	$+\infty$
Y	0	3	0	-1	0	3	3	3	$+\infty$

c)


Si $x \leq -1$, es un trozo de recta.

Si $x > -1$, es un trozo de parábola. ($V_x = 0$)

Tabla de valores:

X	$-\infty$	-2	-1	-1	0	1	2	$+\infty$
Y	$+\infty$	1,5	1	-1	0	-1	-4	$-\infty$


La gráfica es:




FUNCIONES CON VALOR ABSOLUTO

EJERCICIO 24 : Representa gráficamente la función $y = |f(x)|$, sabiendo que la gráfica de $y = f(x)$ es la siguiente:


a)




b)




c)



d)




e)




Solución:


a)




b)




c)



d)



e)



EJERCICIO 25 : Define como funciones "a trozos":

a) $y = |2x + 4|$

b) $y = |-x + 3|$

c) $y = \left| \frac{x+1}{2} \right|$

d) $y = |3x - 2|$

e) $y = \left| \frac{3x+1}{2} \right|$

Solución:

$$a) y = \begin{cases} -2x-4 & \text{si } x < -2 \\ 2x+4 & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$$

$$b) y = \begin{cases} -x+3 & \text{si } x < 3 \\ x-3 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$


$$c) y = \begin{cases} -\frac{x+1}{2} & \text{si } x < -1 \\ \frac{x+1}{2} & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

$$d) y = \begin{cases} -3x+2 & \text{si } x < \frac{2}{3} \\ 3x-2 & \text{si } x \geq \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$e) y = \begin{cases} -\frac{3x+1}{2} & \text{si } x < \frac{-1}{3} \\ \frac{3x+1}{2} & \text{si } x \geq \frac{-1}{3} \end{cases}$$

TRANSFORMACIONES DE FUNCIONES

EJERCICIO 26 : La siguiente gráfica corresponde a la función $y = f(x)$




A partir de ella, representa:

a) $y = f(x) - 3$


b) $y = f(x + 2)$

Solución:

a)




b)



(La gráfica de $f(x)$ no es necesario incluirla. La añadimos para que se aprecie más claramente la transformación).

EJERCICIO 27 : A partir de la gráfica de $y = f(x)$




construye las gráficas de:

a) $y = f(x) + 2$


b) $y = -f(x)$

Solución:

a)




b)



(La gráfica de $f(x)$ no es necesario incluirla. La añadimos para que se aprecie más claramente la transformación).

EJERCICIO 28 : Sabiendo que la gráfica de $y = f(x)$ es la siguiente:




construye, a partir de ella, las gráficas de:

a) $y = f(x - 1)$


b) $y = f(x) - 1$

Solución:

a)




b)



(La gráfica de $f(x)$ no es necesario incluirla. La añadimos para que se aprecie más claramente la transformación).

EJERCICIO 29 : Esta es la gráfica de la función $y = f(x)$.




Representa, a partir de ella, las funciones:

a) $f(x - 2)$


b) $y = -f(x)$

Solución:

a)




b)



(La gráfica de $f(x)$ no es necesario incluirla. La añadimos para que se aprecie más claramente la transformación).

EJERCICIO 30 : La siguiente gráfica es la de $y = f(x)$.



Representa, a partir de ella, las funciones:



a) $y = f(x) + 1$

b) $y = f(x + 1)$

Solución:

a)

b)







(La gráfica de $f(x)$ no es necesario incluirla. La añadimos para que se aprecie más claramente la transformación).

RECOPIACIÓN

EJERCICIO 31 : Asocia cada una de estas gráficas con su correspondiente ecuación:





- a) $y = \frac{2}{3}x$ b) $y = 2x^2 - 3$ c) $y = 3,5x - 0,75$ d) $y = -x^2 + 4$



Solución: a) III b) I c) II d) IV

EJERCICIO 32 : Asocia a cada una de estas gráficas una de las siguientes expresiones analíticas:





- a) $y = \frac{-3x^2}{4}$ b) $y = \frac{-3x}{4}$ c) $y = 2x^2 - 2$ d) $y = 2x - 2$



Solución: a) II b) I c) IV d) III

EJERCICIO 33 : Asocia a cada una de estas gráficas su ecuación:


- a) $y = \frac{1}{x-4}$ b) $y = \sqrt{2x}$ c) $y = \frac{1}{x} + 2$ d) $y = -\sqrt{x+1}$



Solución: a) IV b) III c) I d) II

EJERCICIO 34 : Asocia cada gráfica con su correspondiente ecuación:

- a) $y = \frac{1}{x} - 3$ b) $y = \sqrt{x-3}$ c) $y = \frac{1}{x-3} + 2$ d) $y = \sqrt{x+3}$



Solución: a) III b)II c) I d) IV

PROBLEMAS

EJERCICIO 35 : En algunos países se utiliza un sistema de medición de la temperatura distinto a los grados centígrados que son los grados Farenheit. Sabiendo que $10\text{ }^{\circ}\text{C} = 50\text{ }^{\circ}\text{F}$ y que $60\text{ }^{\circ}\text{C} = 140\text{ }^{\circ}\text{F}$, obtén la ecuación que nos permita traducir temperaturas de $^{\circ}\text{C}$ a $^{\circ}\text{F}$.

Solución:

Llamamos x a la temperatura en grados centígrados e y a la temperatura en grados Farenheit. La función que buscamos pasa por los puntos $(10, 50)$ y $(60, 140)$. Será una recta con pendiente:

$$m = \frac{140 - 50}{60 - 10} = \frac{90}{50} = \frac{9}{5}$$

La ecuación es: $y - 50 = \frac{9}{5}(x - 10) \Rightarrow y = \frac{9}{5}x + 32$


EJERCICIO 36 : En un contrato de alquiler de una casa figura que el coste subirá un 2% cada año. Si el primer año se pagan 7200 euros (en 12 recibos mensuales):

- a) ¿Cuánto se pagará dentro de 1 año? ¿Y dentro de 2 años?
 b) Obtén la función que nos dé el coste anual al cabo de x años.

Solución:

- a) Dentro de 1 año se pagarán $7200 \cdot 1,02 = 7344$ euros.
 Dentro de 2 años se pagarán $7200 \cdot 1,02^2 = 7490,88$ euros.
 b) Dentro de x años se pagarán: $y = 7200 \cdot 1,02^x$ euros.


EJERCICIO 37 : Con 200 metros de valla queremos acotar un recinto rectangular aprovechando una pared:



- a) Llama x a uno de los lados de la valla. ¿Cuánto valen los otros dos lados?
 b) Construye la función que nos da el área del recinto.

Solución:

- a) b) Área = $x(200 - 2x) = 200x - 2x^2$



EJERCICIO 38 : Una barra de hierro dulce de 30 cm de larga a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ se calienta, y su dilatación viene dada por una función lineal $l = a + bt$, donde l es la longitud (en cm) y t es la temperatura (en $^{\circ}\text{C}$).

- a) Halla la expresión analítica de l , sabiendo que $l(1)=30,0005$ cm y que $l(3)=30,0015$ cm.
 b) Representa gráficamente la función obtenida.

Solución:


$$\begin{cases} I(1) = 30,0005 \Rightarrow a + b = 30,0005 \\ I(3) = 30,0015 \Rightarrow a + 3b = 30,0015 \end{cases}$$

Restando a la segunda ecuación la primera, queda:


$$2b = 0,0010 \Rightarrow b = 0,0005 \rightarrow$$

$$a = 30,0005 - b = 30,0005 - 0,0005 = 30$$

$$\text{Por tanto: } I = 30 + 0,0005t$$



EJERCICIO 39 : En un cuadrado de lado x cm, consideramos el área de la parte que está coloreada:




- a) Halla la ecuación que nos da el valor de dicha área, y , en función del lado del cuadrado, x .
 b) Representa gráficamente la función obtenida.

Solución:

a) El área del triángulo es $\frac{x^2}{2}$.

El área del cuadradito es $\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}$.

Por tanto, el área total será: $y = \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} = \frac{3x^2}{4}$



EJERCICIO 40 : Un tendero tiene 20 kg de manzanas que hoy venderá a 40 céntimos de euro/kg. Cada día que pasa se estropeará 1 kg y el precio aumentará 10 céntimos de euro/kg.

- a) Escribe la ecuación que nos da el beneficio obtenido en la venta, y , en función de los días que pasan hasta que vende las manzanas, x .
 b) Representa la función obtenida, considerando que x puede tomar cualquier valor $x \geq 0$,

Solución:

a) Si pasan x días:

Tendrá $(20-x)$ kg y los venderá a $(40+10x)$ céntimos de euro cada uno.

Por tanto, obtendrá un beneficio de:

$$y = (20 - x)(40 + 10x) = 800 + 200x - 40x - 10x^2$$

$$y = -10x^2 + 160x + 800$$

